

Abb. 79: *Callirhytis glandium* (Giraud), Fotos K. Hellrigl: Pomarolo, Zerreiche, 02.11.2007;
 (a) Gallwespenbefall: befallene Placken sind sauber abgegrenzt, Eicheln bleiben oft keimfähig (Foto).



Abb. 79b: Rüsselkäferbefall an Eicheln von Zerreiche: Eichel wird innen zerstört.



Abb. 80: *Callirhytis rufescens* (Mayr), Fotos K. Hellrigl: Pomarolo, Zerreiche, 02.11.2007.



Abb. 82: [*Chilaspis nitida* (Giraud) (agam)]
 (a) [= *Chilaspis loewii* Wachtl.] (sexual form)
 Zerreiche; aus WACHTL 1882:
 Wiener Ent. Ztg. I., Abb. Fig. 2;
 (b) *Chilaspis nitida* (agam) Blattgallen:
 Zerreiche: Botanisch. Gart. Jena 24.09.06;
 Foto H. Buhr: Photogalerie.



Abb. 83: *Cynips agama* Hartig (?)
 (a) K. Hellrigl: Castelfeder, 16.09.2007, 2 Gallen (?);
 (b) K. Hellrigl: Pomarolo, 19.07.2008 (?)
 (c) Foto H. Bellmann, Deutschland, 20.09.2005.



Abb.84: *Cynips cornifex* (Hartig 1843)
 (a) Foto Leo Unterholzner, Vinschgau, 23.06.2004;
 (b) Foto S. Minerbi, Laas-Eyrs, Leiten 900 m, 20.08.08;
 (c) Fotos Hellrigl: „Hörnchengallen“, Trentino 2005/08.




Abb.85: *Cynips disticha* Hartig, „Zweizellengalle“ – Fotos K. Hellrigl: Eisacktal, 2005/08;





Abb. 86: [*Cynips divisa* Hartig (agam)]
 (a) Foto H. Bellmann, 11.08.2006;
 (b) coll. A. KOFLER (Lienz):
 Dölsach/Arguntum, 23.07.2008.



Abb. 87: [*Cynips longiventris* Hartig]
 (a) K. Hellrigl: Junggallen aus Lienz, Okt.2008;
 (b) coll. A. KOFLER (Lienz): an Stieleiche, 2008;
 (c) "Zierralle" – Foto H. Bellmann, 11.08.2006.




Abb. 88: *Cynips quercus* (Geoffroy), Fotos K. Hellrigl: Etschtal, 2005/08.





Abb. 88: *Cynips quercus* (Geoff.): Etschtal (oben)

Abb. 89: *Cynips quercusfolii* L. (rechts u. unten)
Wespen ♀♀ (agame Generation),
im Herbst aus Blattgallen.






Abb. 89a: Knospengallen (oben)
von *Cynips quercusfolii* L.
(bisexuelle Generation) im Frühjahr.

Abb. 89b: Blattgallen (agam) (rechts und unten)
Cynips quercusfolii im Sommer bis
Herbst;
Fotos K. Hellrigl: Eisacktal, 2004/08.





Abb. 89c: Blattgallen (agam) von *Cynips quercusfolii*:
 Junggallen sind oft stark höckerig (links oben),
 Gallen an Stieleiche oft besonders glatt (rechts oben);
 Gallen an Traubeneiche (unten links)

Abb. 90: *Dryocosmus nervosus* (Giraud), [agame Generation = *Dryocosmus cerriphilus* Giraud]:
 (a) DALLA TORRE & KIEFFER 1910: Abb.81 (*D. cerriphilus*).
 (b) vgl. HENSCHEL 1888: Fig.2 (*Dryocosmus cerriphilus*).




Abb.91: *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, “Kastaniengallwespe” – “Cinipide galligeno del Castagno”:
 (a) Dr. K. Mair: Terlan, 28.05.2008, saniierter Kastanienbaum;
 (b) Fotos K. Hellrigl: Trentino, Judikarien, Storo, 03.06.2008.



Abb. 92: *Plagiotrochus* (= *Dryocosmus*) *australis* (Mayr), Fotos K. Hellrigl: Trentino, *Quercus ilex*, 08.06.2008.



Abb. 95: *Neuroterus albipes* (Schenck), (a) Sexual-Gen.: „Blattrandgallen“ 2 Gallen.



Abb. 95: *Neuroterus albipes*, (b) agame Gen.: „Schüsselchen“ (teilw. ?); 6 Gallen
Fotos K. Hellrigl: Südtirol-Trentino, 2006-2008.




Abb. 96: *Neuroterus anthracinus* (Curtis), „Austerngalle“ – (= *Cynips ostra* Hartig):
Fotos K. Hellrigl: Südtirol-Trentino, 2005-2008.



Abb. 97: *Neuroterus aprilius* (Giraud) – „Aprilgalle“,
(a) Fotos K. Hellrigl: Neustift, 06.05.2006 / 07.05.2008;
(b) Foto S. Minerbi: Montiggl, 20.04.2005.



Abb. 98: [*Neuroterus lanuginosus* Giraud]
Foto H. Bellmann: Istrien, 30.08.2008.



Abb. 99: *Neuroterus minutulus* Giraud, Fotos K. Hellrigl: Pomarolo, Zerreiche, 17.10.2008.



Abb. 100: *Neuroterus numismalis* (Geoffroy), Fotos K. Hellrigl: Südtirol-Trentino, 2006-2008.



Abb. 101: *Neuroterus quercusbaccarum* (L.), (a) Beerengallen: Fotos K. Hellrigl.



Abb. 101: *Neuroterus quercusbaccarum* (L.), (b) Linsengallen: Fotos K. Hellrigl.



Abb. 102: *Neuroterus saliens* (Kollar)
 (a.) agame Gen.: (unten)
 Foto K. Hellrigl: Pomarolo,
 Zerreiche, 2007/08;
 (b.) sexual Gen.: (rechts)
 HENSCHEL (1888: Fig. 29:
Neuroterus glandiformis).



Abb. 103: *Neuroterus tricolor* (Hartig)

(a) Sexual-Gen.: „Borstige Kugelgalle“ (?) - VII.2008; [oder parasitierte „Beerengalle“
N. quercusbaccarum ?] 2 Gallen

(b) agame Gen.: „Schüsselchen“ (teilw. ?); 6 Gallen, Fotos K. Hellrigl: Südtirol-Trentino, 2006-2008.



Abb. 104: *Pseudoneuroterus macropterus* (Hartig)
Fotos K. Hellrigl: Castelfeder 2005/06;
Pomarolo 2007/08; Zweigverdickungen
an Zerreiche (*Quercus cerris*).



Abb. 105: *Trigonaspis megaptera* (Panzer)
 (a) „Kugelgallen“ (sexual Gen.)
 Foto H. Bellmann: 2006;
 (b) „Nierengallen“ (agame Gen.)
 Foto H. J. Buhr: 10.2003.



Abb. 106: *Trigonaspis synaspis* (Hartig)
 „Blattgallen“ (agame Gen.)
 Foto K. Hellrigl: Eisacktal 2005/08.



Abb. 106: *Trigonaspis synaspis* (Hartig): (Fortsetzung) „Blattgallen“, Eisacktal:
und abgefallene Gallen (unten links).



Abb. 106: *Trigonaspis synaspis* (Hartig): (Fortsetzung) „Blattgallen“, Eisacktal:
Habitat in Neustift (oben links); Junggallen Mahr, 15.09.2008 (unten rechts).



Abb. 113: *Synophrus politus* Hartig

(a) Galle mit Wespe: Rovereto, Zerreiche, 30.09.2005;

(b) Gallen an Zerreiche, Pomarolo, 07.09.2008;

(c) Große Holzgalle Korkeiche, Pharmaziemuseum Peer. Fotos K. Hellrigl: Okt. 2005-2008.



Abb. 124: *Synergus physoceras* Hartig, (mit auffällig verdickten Fühlern des ♂):
aus Gallen von *Trigonaspis synaspis*; Fotos K. Hellrigl: Neustift, XI.2005.



Abb. 126: *Synergus reinhardi* Mayr, Foto K. Hellrigl: in verkümmerten Junggallen von *A. quercustozae*,
Rovereto, 05.10.07; daraus schlüpften Aug. 2008 die Inquilinen.



Abb. 128: *Synergus thaumacerus* (Dalman), (mit verdickten Fühlern des ♂; mit Legestachel beim ♀)
Fotos K. Hellrigl: Pomarolo, 2008 (aus: *Aphelonyx*-Gallen);




Abb. 130: *Synergus umbraculus* (Olivier)
Foto K. Hellrigl: Pomarolo, 2008 (♂ aus: *A. quercustozae*):
[viele auch aus *A. truncicolus*]

Abb. 132: *Ibalia leucospoides* (Hochenw.)
Fotos K. Hellrigl: Kaltern, ex *Abies*, Sept. 1983;
[Wespe: mit stark komprimiertem Abdomen,
in Lateral- und Dorsalansicht].

