

MONTIGGL 1992 - 1996 BIOLOGISCHE UND ÖKOLOGISCHE HINWEISE

AUFSCHLÜSSELUNG DER GEFANGENEN ARTEN										BIOLOGISCHE UND ÖKOLOGISCHE HINWEISE																								
FAMILY	SPECIES	gefangene Exemplare	Anzahl der Fänge	Arten pro Familie	eurytpe Art	stenotpe Art	polytpe Art	xylophage Art	phytophage Art	pollenophage Art	coprophage Art	necrophage Art	carnivore Art	mycetophage Art	entomophage Art	Nahrungsspezialist	xerophile Art	hygrophile Art	thermophile Art	saprophile Art	phileophile Art	arbitale Art	corticole Art	floricole - herbicole Art	silvicole Art	succicole Art	pratitcole Art	humitcole Art	detrificole Art	Rote Liste Südtirols	bemerkenswerte Funde	Neufund	lokale Häufigkeit	
ALLECULIDAE	ALLECULA MORIO	1	1		x																	x							x		s			
	CTENIOPUS FLAVUS	35	10		x														x												sh			
	GONODERA LUPERUS	1	1		x														x												uh			
	HYMENALIA RUFIPES	184	55		x													x													h			
	ISOMIRA HYPOCRITA	2	1		x																										?			
	ISOMIRA MARCIDA	87	36		x																										?			
	ISOMIRA TESTACEA	23	13		x																										?			
	MYCETOCHARA LINEARIS	1	1		x										x				x												nh			
	PSEUDOCISTELA CERAMBOIDES	11	7		x																											h		
		345	125	10	0	10									1			1	4	2	5	3	2	2						3	1	1	0	
ANOBIIDAE	ANOBIUM DENTICOLLIS	1	1		x			x																								s		
	ANOBIUM HEDERE	1	1			x		x											x													h		
	ANOBIUM PUNCTATUM	1	1			x		x																								h		
	EPISERNUS GANGLBAUERI	1	1			x		x																								?		
	ERNOBIUS ABIETIS	1	1			x		x																								nh		
	ERNOBIUS MOLLIS	3	3			x		x																								sh		
	ERNOBIUS NIGRINUS	3	3			x		x																								s		
	ERNOBIUS PINI	2	2			x		x																								nh		
	HEDOBIA IMPERIALIS	5	3			x		x																								h		
	HEDOBIA PUBESCENS	8	3			x		x																								h		
	MESOCOELOPUS NIGER	3	2			x		x																								sh		
	OCHINA PTINOIDES	2	1			x		x																								h		
	OLIGOMERUS BRUNNEUS	9	9			x		x																								h		
	PSEUDOPTILINUS FISSICOLLIS	3	2			x		x																								h		
		43	33	14	5	9	14											2	4	1	8	9	1								4	6	2	
ANOBIIDAE Ergebnis																																		
	ANTHICUS VENUSTUS	1	1			x												x														s		
ANTHICIDAE Ergebnis		1	1	1	0	1												1	1													1	1	0
	ANTHRIBIUS ALBINUS	25	20			x									x																	sh		
ANTHRIBIDAE	BRACHYTARSUS FASCIATUS	2	1			x																										s		
	BRACHYTARSUS NEBULOSUS	10	4			x																										sh		

*nicht quantitativ erfasste Freilandernhebungen

die lokale Häufigkeit ist rein subjektiv bemessen

MONTIGGL 1992 - 1996 BIOLOGISCHE UND ÖKOLOGISCHE HINWEISE

AUFSCHLÜSSELUNG DER GEFANGENEN ARTEN					BIOLOGISCHE UND ÖKOLOGISCHE HINWEISE																												
FAMILY	SPECIES	gefangene Exemplare	Anzahl der Fänge	Arten pro Familie	eurytpe Art	stenotope Art	polytpe Art	xylophage Art	phytothage Art	pollenophage Art	coprophage Art	necrophage Art	carnivore Art	mycetophage Art	entomophage Art	Nahrungsspezialist	xerophile Art	hygrophile Art	thermophile Art	saprophile Art	phileophile Art	arbitrale Art	coritcole Art	floricole - herbicole Art	silvicole Art	succicole Art	praticeole Art	humicole Art	detriticole Art	Rote Liste Südteils	Bemerkenswerte Funde	Neufund	lokale Häufigkeit
	DISSOLEUCAS NIVEIROSTRIS	12	6		x									x				x	x	x		x	x	x	x								sh
	ENEDREUTES SEPICOLA	15	8		x									x				x	x	x		x	x	x								h	
	PHAECHROTES CINCTUS	17	12		x			x						x					x	x		x	x									sh	
	RHAPHITROPIS OXYACANTHAE	1	1		x																									x		?	
	TROPIDERES ALBIROSTRIS	60	39		x			x						x									x	x								sh	
	ULORHINUS BILINEATUS	2	1		x										x								x	x									h
ANTHRIBIDAE Ergebnis					144	92	9	2	7				2	6	2		2	3				4	5	8				3	0	1	1		
BIPHYLLIDAE	DIPLOCOELUS FAGI	1	1		x									x									x									sh	
BIPHYLLIDAE Ergebnis					1	1	1	0	1					1									1							0	0	0	
BOSTRYCHIDAE	BOSTRYCHUS CAPUCINUS	3	1		x			x																									sh
	SINOXYLON PERFORANS	6	4			x		x										x	x			x										h	
	SINOXYLON SEXDENTATUM	3	2			x		x										x	x			x										nh	
	XYLOPERTHA RETUSA	16	7			x		x															x	x								h	
BOSTRYCHIDAE Ergebnis					28	14	4	1	3								2	3				3	1							0	0	0	
BRUCHIDAE	SERMOPHAGUS SERICEUS	1	1		x				x															x								?	
BRUCHIDAE Ergebnis					1	1	1	0	1																1					0	0	0	
BUPRESTIDAE	ACMAEODERA BIPUNCTATA	1	1		x			x											x						x								s
	ACMAEODERA FLAVOFASCIATA	26	13		x			x											x						x								sh
	AGRILUS ANGUSTULUS	3	3		x			x											x														h
	AGRILUS GRAMINIS	9	7		x			x											x														h
	AGRILUS PRATENSIS	1	2		x			x											x														h
	ANTHAXIA FULGURANS	66	11		x			x											x						x								h
	ANTHAXIA FUNERULA	8	5		x			x											x						x								nh
	ANTHAXIA GODETI	205	28		x			x											x						x								sh
	ANTHAXIA HELVETICA	12	7		x			x											x						x								nh
	ANTHAXIA MORIO	3	2		x			x											x						x								nh
	ANTHAXIA NITIDULA	18	8		x			x											x						x								h
	ANTHAXIA PODOLICA	121	29		x			x											x						x								sh
	ANTHAXIA QUADRIPUNCTATA	30	10		x			x											x						x								h
	CHRYSOBOTHRIS AFFINIS	1	1		x			x												x													s

*nicht quantitativ erfaßte Freilandbeobachtungen

die lokale Häufigkeit ist rein subjektiv bemessen

MONTIGGL 1992 - 1996 BIOLOGISCHE UND ÖKOLOGISCHE HINWEISE

AUFSCHLÜSSELUNG DER GEFANGENEN ARTEN					BIOLOGISCHE UND ÖKOLOGISCHE HINWEISE																												
FAMILY	SPECIES	gefangene Exemplare	Anzahl der Fänge	Arten pro Familie	eurytpe Art	stenotpe Art	polytpe Art	xylophage Art	phytophage Art	pollenophage Art	coprophage Art	necrophage Art	carnivore Art	mycetophage Art	entomophage Art	Nahrungsspezialist	xerophile Art	hygrophile Art	thermophile Art	saprophile Art	phileophile Art	arbicole Art	coritcole Art	floricole - herbicole Art	silvicole Art	succicole Art	pratitcole Art	humitcole Art	detriticole Art	Rote Liste Südteils	bemerkenswerte Funde	Neufund	lokale Häufigkeit
	CHRYSOBOTHRIS IGNIVENTRIS	39	2		x			x										x	x			x											h
	CHRYSOBOTHRIS SOLIERI	2	2		x			x										x				x											nh
BUPRESTIDAE Ergebnis					3	13	16	11									16					3	10							0	0	0	
BYTURIDAE	BYTURUS TOMENTOSUS	14	6		x				x																x							h	
BYTURIDAE Ergebnis		14	6	18	1	0	1		1															1							0	0	0
CANTHARIDAE	RHAGONYCHA LIGNOSA	1	1		x																		x	x								?	
CANTHARIDAE Ergebnis		1	1	1	1	0																1	1								0	0	0
CARABIDAE					x								x					x								x						sh	
	ABAX PARALLELEPIPEDUS	321	130		x								x						x														sh
	AMARA AENEA	14	13		x								x						x														sh
	AMARA ANTHOBIA	2	2		x								x						x														?
	AMARA BIFRONS	1	1		x								x						x														?
	AMARA COMMUNIS	3	2		x								x						x														nh
	AMARA CURTA	16	9		x								x						x														h
	AMARA NITIDA	2	2		x								x						x														?
	AMARA OVATA	2	2		x								x						x														?
	AMARA SP.	1	1										x																				?
	BEMBIDION LAMPROS	1	1		x								x						x														?
	BEMBIDION MILLERI	3	1		x								x						x														?
	BEMBIDION NITIDUM	1	1										x																				?
	BRADYCELLUS HARPALINUS	13	1		x								x						x														h
	CALATHUS FUSCIPES	1	1		x								x																				h
	CALOSOMA INQUISITOR	1	1		x								x																				nh
	CARABUS CONVEXUS	3	3		x								x																				nh
	CARABUS CORIACEUS	29	28		x								x																				sh
	CARABUS GRANULATUS	1	1		x								x																				nh
	CHLAENIUS VESTITUS	1	1		x								x																				nh
	CICINDELA CAMPESTRIS	3	1		x								x																				h
	CYCHRUS ITALICUS	20	16										x																				sh
	CYNINDIS AXILLARIS	1	1		x								x																				nh
	DROMIUS AGILIS	1	1		x								x																				h

*nicht quantitativ erfaßte Freilandbeobachtungen

die lokale Häufigkeit ist rein subjektiv bemessen

MONTIGGL 1992 - 1996 BIOLOGISCHE UND ÖKOLOGISCHE HINWEISE

AUFSCHLÜSSELUNG DER GEFANGENEN ARTEN					BIOLOGISCHE UND ÖKOLOGISCHE HINWEISE																												
FAMILY	SPECIES	gefangene Exemplare	Anzahl der Fänge	Arten pro Familie	eurytpe Art	stenotope Art	polyphage Art	xylophage Art	phytophage Art	pollenophage Art	coprophage Art	nectrophage Art	carnivore Art	mycetophage Art	entomophage Art	Nahrungsspezialist	xerophile Art	hygrophile Art	thermophile Art	saprophile Art	pholeophile Art	arbicole Art	corricole Art	floricole - herbicole Art	silvicole Art	succicole Art	psittacole Art	humicole Art	detrificole Art	Rote Liste Südteils	bemerkenswerte Funde	Neufund	lokale Häufigkeit
CARABIDAE Ergebnis	DROMIUS QUADRIMACULATUS	4	4		x								x									x				x						h	
	HARPALUS CALCEATUS	1	1		x								x																			?	
	HARPALUS FROELICHI	1	1		x								x																			?	
	HARPALUS GRISEUS	14	9		x								x																			sh	
	HARPALUS RUBRIPES	4	3		x								x																			h	
	HARPALUS RUFIPES	18	7		x								x																			sh	
	HARPALUS RUFITARSIS	1	1		x								x																			?	
	HARPALUS RUPICOLA	1	1		x								x																			?	
	HARPALUS SERRIPES	1	1		x								x																			?	
	HARPALUS TARDUS	10	8		x								x																			h	
	LASIOTRECHUS DISCUS	1	1			x								x																		s	
	NOTIOPHILUS BIGUTTATUS	21	18		x								x																			sh	
	CATOPIIDAE	NOTIOPHILUS RUFIPES	31	22		x							x																				sh
PLATYDERUS RUFUS		1	1		x								x																			sh	
PTEROSTICHUS MELANARIUS		2	2		x								x																			s	
TACHYS BISTRIATUS		1	1		x								x																			s	
TACHYS BISULCATUS		1	1		x								x																			s	
CARABIDAE Ergebnis		564	302	40	36	3							40			2	17	13					17	3	2	1	9	2	4	7	10	10	0
CATOPIIDAE Ergebnis	CATOPS NIGRICLAVIS	2	2		x						x	x	x									x										nh	
	CATOPS SUBFUSCUS	28	9			x					x	x	x																			sh	
	CHOLEVA STURMI	1	1			x					x	x	x																			s	
	SCIODREPOIDES WATSONI	47	13		x						x	x	x																			sh	
CATOPIIDAE Ergebnis	78	25	4	2	2						4	4	4							1	3									1	1	1	0
CERAMBYCIDAE	ACANTHOCINUS AEDILIS	1	1			x		x	x														x	x									s
	ACMAEOPS COLLARIS	28	15			x		x	x																x							sh	
	AGAPANTHIA CARDUI	9	2			x			x																x							h	
	AGAPANTHIA VILLOSOVERIDESCENS	2	1		x				x																x							h	
	ANAEETHETIS TESTACEA	169	36			x		x	x																							sh	
	CERAMBYX SCOPOLII	5	3		x			x	x																							sh	
	CERAMBYX VELUTINUS	1	1			x		x	x																							s	

*nicht quantitativ erfasste Freilandbeobachtungen

die lokale Häufigkeit ist rein subjektiv bemessen

MONTIGGL 1992 - 1996 BIOLOGISCHE UND ÖKOLOGISCHE HINWEISE

AUFSCHLÜSSELUNG DER GEFANGENEN ARTEN				BIOLOGISCHE UND ÖKOLOGISCHE HINWEISE																														
FAMILY	SPECIES	gefangene Exemplare	Anzahl der Fänge	Arten pro Familie	eurytpe Art	stenotpe Art	polytpe Art	xylophage Art	phytophage Art	pollenphage Art	coprophage Art	necrophage Art	carnivore Art	mycetophage Art	entomophage Art	Nahrungsspezialist	xerophile Art	hygrophile Art	thermophile Art	saprophile Art	phileophile Art	arbitrale Art	coritcole Art	floricole - herbicole Art	silvicole Art	succicole Art	pratitcole Art	humitcole Art	detrititcole Art	Rote Liste Südtirols	bemerkenswerte Funde	Neufund	lokale Häufigkeit	
	CHLOROPHORUS FIGURATUS	67	14		x		x	x	x	x									x	x		x	x										h	
	CHLOROPHORUS PILOSUS	2	2		x			x	x	x									x					x									nh	
	CHLOROPHORUS SARTOR	4	2		x			x	x	x									x					x									h	
	CHLOROPHORUS VARIUS	15	3		x			x	x	x									x					x									h	
	CLYTUS ARIETIS	12	12		x			x	x	x													x										sh	
	CLYTUS LAMA	1	1			x		x	x	x													x										s	
	CORTODERA FEMORATA	11	5			x		x	x	x									x														nh	
	CORTODERA HUMERALIS	2	2			x		x	x	x									x														nh	
	CRIOCEPHALUS RUSTICUS	14	11			x		x	x	x												x											h	
	ERGATES FABER	1	1		x			x	x	x												x											s	
	EXOCENTRUS ADSPERSUS	98	17			x		x	x	x													x										sh	
	EXOCENTRUS LUSITANUS	1	1			x		x	x	x												x											s	
	EXOCENTRUS PUNCTIPENNIS	1	1			x		x	x	x												x											nh	
	GAUROTUS VIRGINEA	1	1			x		x	x	x	x																						s	
	GRAMMOPTERA RUFIGORNIS	5	5		x			x	x	x	x																						h	
	JUDOLIA CERAMBYCIFORMIS	1	1		x			x	x	x	x																						h	
	JUDOLIA ERRATICA	3	3			x		x	x	x	x									x													h	
	LEIOPUS NEBULOSUS	24	16		x			x	x	x	x												x										sh	
	LEPTURA FULVA	1	1		x			x	x	x	x																						s	
	LEPTURA LIVIDA	6	3		x			x	x	x	x									x													h	
	LEPTURA SANGUINOLENTA	3	2			x		x	x	x	x																						h	
	LEPTURA SEXGUTTATA	1	1			x		x	x	x	x																						nh	
	MEGOPSIS SCABRICORNIS	1	1			x		x	x	x																								s
	MESOSA CURCULIONIDES	1	1			x		x	x	x																								h
	MESOSA NEBULOSA	3	3		x			x	x	x																								s
	MOLORCHUS MARMOTTANI	1	1			x		x	x	x																								ss
	MOLORCHUS MINOR	1	1		x			x	x	x																								nh
MOLORCHUS UMBELLATARUM	2	2			x		x	x	x	x																							h	
MORIMUS ASPER	1	1			x		x	x	x																								nh	
OBRIMUM BRUNNEUM	1	1			x		x	x	x	x																							s	

*nicht quantitativ erfasste Freilandbeobachtungen

die lokale Häufigkeit ist rein subjektiv bemessen

MONTIGGL 1992 - 1996 BIOLOGISCHE UND ÖKOLOGISCHE HINWEISE

AUFSCHLÜSSELUNG DER GEFANGENEN ARTEN										BIOLOGISCHE UND ÖKOLOGISCHE HINWEISE																							
FAMILY	SPECIES	gefangene Exemplare	Anzahl der Fänge	Arten pro Familie	eurytpe Art	stenotpe Art	polytpe Art	xylophage Art	phytophage Art	pollenophage Art	coprophage Art	necrophage Art	carnivore Art	mycetophage Art	entomophage Art	Nahrungsspezialist	xerophile Art	hygrophile Art	thermophile Art	saprophile Art	pholeophile Art	arbitcole Art	coritcole Art	floricole - herbicole Art	silvicole Art	succicole Art	pratitcole Art	humicole Art	detrificole Art	Rote Liste Südtirols	bemerkenswerte Funde	Neufund	lokale Häufigkeit
	PARMENA UNIFASCIATA	7	3			x	x	x	x										x							x				x			h
	PHYMATODES ALNI	15	9			x	x	x	x	x													x			x						sh	
	PHYMATODES PUSILLUS	13	11			x	x	x	x														x			x						sh	
	PHYMATODES TESTACEUS	13	8		x			x	x	x											x		x		x							sh	
	PLAGIONOTUS ARCUATUS	3	3			x	x	x	x														x		x							h	
	POGONOCHERUS HISPIDULUS	2	1		x			x	x	x													x		x							h	
	POGONOCHERUS HISPIDUS	16	5			x	x	x	x	x												x		x								sh	
	PRIONUS CORIARIUS	4	4			x	x	x	x	x												x										h	
	PSEUDOSPHEGOTES CINAREUS	1	1			x	x	x	x	x														x								nh	
	PURPURICENUS KAEHLERI	2	2			x	x	x	x	x	x									x			x									nh	
	RHAGIUM INQUISITOR	4	1			x	x	x	x	x													x									h	
	RHAGIUM MORDAX	1	1			x	x	x	x	x																						s	
	RHAGIUM SYCOPHANTA	3	2			x	x	x	x	x													x				x					h	
	RHOPALOPUS FEMORATUS	3	3			x	x	x	x	x													x									nh	
	SAPERDA CARCHARIAS	1	1			x	x	x	x	x												x		x								s	
	SAPERDA POPULNEA	1	1			x	x	x	x	x												x										s	
	STENOCORUS MERIDIANUS	1	1			x		x	x	x	x													x								s	
	STENOPTERUS RUFUS	30	17			x			x	x	x													x									sh
	STRANGALIA BIFASCIATA	5	5			x	x	x	x	x	x													x								h	
	STRANGALIA MACULATA	6	2			x		x	x	x	x													x								h	
	STRANGALIA MELANURA	20	10			x		x	x	x	x													x								sh	
	STRANGALIA NIGRA	5	3			x			x	x	x													x								h	
	STRANGALIA REVESTITA	1	1			x	x	x	x	x	x																					nh	
	TETROPIUM FUSCUM	2	1			x		x	x	x																							h
	TETROPS PRAEUSTA	1	1			x			x	x																							nh
	TRICHOFERUS GRISEUS	3	3			x	x	x	x	x												x		x								x	
	XYLOTRECHUS ANTILOPE	33	27			x	x	x	x	x													x									sh	
XYLOTRECHUS ARVICOLA	1	1			x	x	x	x	x													x									s		
CERAMEYCIDAE Ergebnis	697		303	65	20	45	65	65	31								8	22	9	31	25	32	35	3	2	10	4	5	1			h	
CHRYSOMELIDAE	1		2		x			x														x										h	

*nicht quantitativ erfasste Freilandernhebungen

die lokale Häufigkeit ist rein subjektiv bemessen

MONTIGGL 1992 - 1996 BIOLOGISCHE UND ÖKOLOGISCHE HINWEISE

AUFSCHLÜSSELUNG DER GEFANGENEN ARTEN										BIOLOGISCHE UND ÖKOLOGISCHE HINWEISE																							
FAMILY	SPECIES	gefangene Exemplare	Anzahl der Fänge	Arten pro Familie	eurytpe Art	stenotope Art	polyphage Art	xylophage Art	phytophage Art	pollenophage Art	coprophage Art	necrophage Art	carnivore Art	mycetophage Art	entomophage Art	Nahrungsspezialist	xerophile Art	hygrophile Art	thermophile Art	saprophile Art	phileophile Art	arbitrale Art	corticole Art	floricole - herbicole Art	silvicole Art	succicole Art	pratricole Art	humicole Art	detriticole Art	Rote Liste Südtirols	bemerkenswerte Funde	Neufund	lokale Häufigkeit
CHRYSOMELIDAE Ergebnis	CHALCOIDES LAMINA	0	1		X				X									X		X			X									s	
	COPTOCEPHALA UNIFASCIATA	4	1			X			X									X		X				X								h	
	CRYPTOCEPHALUS BIMACULATUS	1	1			X			X															X								nh	
	CRYPTOCEPHALUS BIPUNCTATUS	1	1			X			X									X		X												nh	
	CRYPTOCEPHALUS FLAVIPES	1	1			X			X									X		X												h	
	CRYPTOCEPHALUS LABIATUS	1	1		X				X									X								X						nh	
	CRYPTOCEPHALUS OCTOMACULATUS	10	6			X			X									X		X												sh	
	CRYPTOCEPHALUS PINI	6	2			X			X																	X						h	
	CRYPTOCEPHALUS QUERCETI	2	2			X			X																	X						h	
	CRYPTOCEPHALUS SERICEUS	7	1			X			X															X								h	
	DLOCHRYSA FASTUOSA	5	1			X			X																X							sh	
	EXOSOMA LUSITANICA	129	18			X			X																X							sh	
	GALERUCA TANACETI	1	1			X			X									X							X							h	
	GALERUCILLA LUTEOLA	1	1			X			X									X							X							nh	
	GASTROIDAE VIRIDULA	7	1			X			X																X							sh	
	GYNANDROPTHALMA AURITA	4	4			X			X										X													nh	
	LACHNAEA ITALICA	1	1			X			X										X		X											h	
CHRYSOMELIDAE Ergebnis		182	46	18	7	11	18										5	5	5			11	8	4						0	0	0	
CLERIDAE	CLERUS MUTILARIUS	1	1			X							X			X							X									s	
	DENOPS ALBOFASCIATUS	1	1			X							X			X			X							X						nh	
	NECROBIA VIOLACEA	2	2			X						X				X																h	
	OPILO MOLLIS	13	13			X							X			X						X				X						sh	
	OPILO PALLIDUS	2	2			X							X			X						X				X						sh	
	THANASIMUS FORMICARIUS	449	72			X							X			X																sh	
	TRICHODES ALVEARIUS	6	2			X							X			X			X													h	
	CLERIDAE Ergebnis	474	93	7	4	3					1	7				7	3					2	3	2	1	5					2	2	0
COCCINELLIDAE	ADALIA BIPUNCTATA	5	4		X										X							X										sh	
	ADALIA DECEMPUNCTATA	1	1		X								X			X						X				X						?	
	ANATIS OCELLATA	1	1		X								X			X						X				X						nh	
	CALVIA DECEMGUTTATA	2	1			X							X			X			X			X				X						nh	

*nicht quantitativ erfasste Freilandbeobachtungen

die lokale Häufigkeit ist rein subjektiv bemessen

MONTIGGL 1992 - 1996 BIOLOGISCHE UND ÖKOLOGISCHE HINWEISE

AUFSCHLÜSSELUNG DER GEFANGENEN ARTEN										BIOLOGISCHE UND ÖKOLOGISCHE HINWEISE																							
FAMILY	SPECIES	gefangene Exemplare	Anzahl der Fänge	Arten pro Familie	eurytpe Art	stenotpe Art	polyphage Art	xylophage Art	phytophage Art	pollenphage Art	coprophage Art	necrophage Art	carnivore Art	mycetophage Art	entomophage Art	Nahrungsspezialist	xerophile Art	hygrophile Art	thermophile Art	saprophile Art	pholeophile Art	arbitcole Art	coritcole Art	floricole - herbicole Art	silvicole Art	succicole Art	pratitcole Art	humitcole Art	detrititcole Art	Rote Liste Südtirols	bemerkenswerte Funde	Neufund	lokale Häufigkeit
	COCCINELLA SEPTEMPUNCTATA	2	2		x								x																				h
	COCCINULA SINUATOMARGINATA	1	1		x								x																				?
	EXOCHOMUS QUADRIPISTULATUS	3	3		x								x																				nh
	HALYZIA SEDECIMGUTTATA	6	3			x																											h
	HARMONIA QUADRIPUNCTATA	30	11			x							x																				sh
	MYRRHA OCTODECIMGUTTATA	9	6			x							x																				h
	SYNHARMONIA LYNCEA	39	33			x							x																				sh
	COCCINELLIDAE Ergebnis	99	66	11	6	5							9	1	10			1	1				8	7	7						1	1	0
	AULONIUM TRISULCUM	1	1			x							x																				nh
	CERYLON FERRUGINEUM	4	4		x																												h
	CERYLON HISTEROIDES	6	5		x																												sh
	COLOBICUS MARGINATUS	5	3			x							x																				sh
	COLYDIUM ELONGATUM	8	7			x							x																				sh
	COXELUS PICTUS	60	16		x																												sh
	DITOMA CRENATA	39	21		x								x																				sh
	SYNCHITA HUMERALIS	5	5		x																												h
COLYDIIDAE Ergebnis	128	62	8	5	3	2							4	5				3				4	7	6						4	2	0	
	LAEMOPHLOEUS ABIETIS	1	1			x																											nh
	LAEMOPHLOEUS ALTERNANS	1	2			x																											nh
	LAEMOPHLOEUS ATER	1	1			x																											nh
	LAEMOPHLOEUS CASTANEUS	3	1			x																											nh
	LAEMOPHLOEUS FERRUGINEUS	2	2			x																											nh
	LAEMOPHLOEUS KRAUSSI	10	5			x																											sh
	LAEMOPHLOEUS MONILIS	23	15			x																											sh
	LAEMOPHLOEUS TESTACEUS	24	12			x																											sh
	MONOTOMA BREVICOLLIS	2	1			x																											h
	PROSTOMIS MANDIBULARIS	2	2			x																											sh
	SILVANOPRUS FAGI	3	3			x																											h
	SILVANUS BIDENTATUS	2	2			x																											h
	SILVANUS UNIDENTATUS	15	7			x																											h

*nicht quantitativ erfasste Freilandernebungen

die lokale Häufigkeit ist rein subjektiv bemessen

MONTIGGL 1992 - 1996 BIOLOGISCHE UND ÖKOLOGISCHE HINWEISE

AUFSCHLÜSSELUNG DER GEFANGENEN ARTEN										BIOLOGISCHE UND ÖKOLOGISCHE HINWEISE																									
FAMILY	SPECIES	gefangene Exemplare	Anzahl der Fänge	Arten pro Familie	eurytpe Art	stenotope Art	polyphage Art	xylophage Art	phytophage Art	pollenophage Art	coprophage Art	necrophage Art	carnivore Art	mycetophage Art	entomophage Art	Nahrungsspezialist	xerophile Art	hygrophile Art	thermophile Art	saprophile Art	phileophile Art	arbkole Art	corticole Art	floricole - herbicole Art	silvikole Art	succicole Art	pratricole Art	humicole Art	detriticole Art	Rote Liste Südtirols	Bemerkenswerte Funde	Neufund	lokale Häufigkeit		
CUCULIONIDAE Ergebnis	ULEIOTA PLANATA	9	8		x			1						1								x	x	11	13	12			2	2	2	0	sh		
	ATTELABUS NITENS	1	1			x			x													x	x									nh			
	CURCULIO ELEPHAS	1	1			x			x											x		x	x									s			
	CURCULIO GLANDIUM	15	7		x				x													x	x									h			
	CURCULIO PELLITUS	10	3			x			x													x	x									h			
	CURCULIO VENOSUS	17	5			x			x													x	x									h			
CURCULIONIDAE Ergebnis	HYLOBIUS ABIETIS	43	33			x		x	x													x	x										sh		
		87	50	6	1	5	1	1	6										1				6	5	4					0	0	0			
	ANTHRENUS MUSEORUM	1	1		x					x		x				x																	nh		
	CTESIAS SERRA	10	4		x					x		x				x				x		x								x	x	h			
	DERMESTES FRISCHI	6	3		x						x	x	x			x																h			
	DERMESTES MURINUS	12	6		x						x	x	x			x					x											h			
DERMESTIDAE Ergebnis	DERMESTES UNDULATUS	377	21		x						x	x	x			x															4	x	sh		
	GLOBICORNIS CORTICALIS	5	5			x				x		x				x																nh			
	MEGATOMA UNDATA	8	7		x					x		x				x																nh			
		419	47	7	6	1				4	3	7	3			7				2		1	1	4	4	1				2	2	2	0		
	AGRIOTES BREVIS	1	1		x				x									x				x	x										sh		
	AGRIOTES PILOSELLUS	6	6		x				x									x					x	x								h			
ELATERIDAE	AGRIOTES USTULATUS	2	1		x													x														h			
	AGRYPNUS MURINUS	1	1		x				x													x	x									sh			
	AMPEDUS AETHIOPS	3	1			x			x																							nh			
	AMPEDUS ELONGATULUS	3	2			x			x																							nh			
	AMPEDUS NIGERRIMUS	1	1			x			x																						4	x	nh		
	AMPEDUS SANGUINEUS	2	1			x			x																						4	x	sh		
	AMPEDUS SINUATUS	1	1			x			x																							s			
	ATHOUS HAEMORRHODALIS	10	5		x				x																							sh			
	ATHOUS SUBFUSCUS	10	6		x				x																							sh			
	ATHOUS VITTATUS	1	1		x				x																							sh			
	CALAMBUS BIPUSTULATUS	2	2			x			x																						3	x	nh		

*nicht quantitativ erfasste Freilandernebungen

die lokale Häufigkeit ist rein subjektiv bemessen

MONTIGGL 1992 - 1996 BIOLOGISCHE UND ÖKOLOGISCHE HINWEISE

AUFSCHLÜSSELUNG DER GEFANGENEN ARTEN										BIOLOGISCHE UND ÖKOLOGISCHE HINWEISE																							
FAMILY	SPECIES	gefangene Exemplare	Anzahl der Fänge	Arten pro Familie	eurytpe Art	stenotpe Art	polyphage Art	xylophage Art	phytophage Art	pollenophage Art	ceprophage Art	necrophage Art	carnivore Art	mycetophage Art	entomophage Art	Nahrungsspezialist	xerophile Art	hygrophile Art	thermophile Art	saprophile Art	phloephophile Art	arbitale Art	coritcole Art	floricole - herbicole Art	silvicole Art	succole Art	pratitcole Art	humitcole Art	detrititcole Art	Rote Liste Südtirols	Bemerkenswerte Funde	Neufund	lokale Häufigkeit
	CARDIOPHORUS NIGERRIMUS	1	1		x				x								x			x													s
	CARDIOPHORUS VESTIGIALIS	2	1			x			x										x														nh
	DENTICOLLIS LINEARIS	2	1						x											x													s
	HEMICREPIDIUS HIRTUS	2	2			x			x											x													h
	LIMONIUS AENEONIGER	16	13			x			x										x														sh
	LIMONIUS QUERCUS	29	13			x			x											x													sh
	MELANOTUS CASTANIPES	1	1			x				x										x													s
	MELANOTUS NIGER	1	1							x										x													s
	MELANOTUS RUFIPES	2	2			x				x											x												nh
	MELANOTUS TENEBROSUS	1	1							x											x												s
	NOTHODES PARVULUS	10	9			x				x											x												h
	PROSTERNON TESSELLATUM	58	10			x				x											x												sh
	STENAGOSTUS VILLOSIUS	1	1			x				x																							nh
ELATERIDAE Ergebnis		169	85	26	14	12	1	26	1								5	3				1	25	9	11	19				1	5	6	0
ENDOMYCHIDAE	MYCETAEA HIRTA	1	1			x								x							x												s
	MYCETINA CRUCIATA	2	2			x								x							x												nh
ENDOMYCHIDAE Ergebnis		3	3	2	2	0								2							2			1						2	0	0	0
EROTYLIDAE	DACNE BIPUSTULATA	13	13			x								x																			h
	TRIPLAX LEPIDA	4	3			x								x																			nh
	TRITOMA BIPUSTULATA	11	10			x								x																			nh
EROTYLIDAE Ergebnis		28	26	3	2	1								3																	0	0	0
EUCNEMIDAE	DIRHAGUS EMYI	1	1			x														x													s
	DIRHAGUS LEPIDUS	1	1			x														x													s
	DIRHAGUS PYGMAEUS	1	1			x																											s
	DROMAEOLUS BARNABITA	4	3			x																											nh
	MELASIS BUPRESTOIDES	3	2			x																											nh
EUCNEMIDAE Ergebnis		2	2			x																											nh
EUCNEMIDAE Ergebnis		12	10	6	1	5																									2	2	0
HISTERIDAE	HISTER CADAVERINUS	12	4			x																											sh
	HISTER TERRICOLA	1	1			x																											?

*nicht quantitativ erfasste Freilandbeobachtungen

die lokale Häufigkeit ist rein subjektiv bemessen

MONTIGGL 1992 - 1996 BIOLOGISCHE UND ÖKOLOGISCHE HINWEISE

AUFSCHLÜSSELUNG DER GEFANGENEN ARTEN										BIOLOGISCHE UND ÖKOLOGISCHE HINWEISE																									
FAMILY	SPECIES	gefangene Exemplare	Anzahl der Fänge	Arten pro Familie	eurytope Art	stenotope Art	polyphage Art	xylophage Art	phytophage Art	pollenophage Art	coprophage Art	necrophage Art	carnivore Art	mycetophage Art	entomophage Art	Nahrungsspezialist	xerophile Art	hygrophile Art	thermophile Art	tiemophile Art	saprophile Art	phileophile Art	arbiticole Art	coritcole Art	floritcole - herbicole Art	silvicole Art	succicole Art	praticole Art	humitcole Art	detrificole Art	Rote Liste Südttirois	bemerkenswerte Funde	Neufund	lokale Häufigkeit	
	HISTER UNICOLOR	84	14		x						x	x	x	x	x							x								x				sh	
	PARALISTER PURPURASCENS	1	1	x							x																							?	
	PAROMALUS PARALLELEPIPEDUS	14	9	x												x									x								sh		
	SAPRINUS SEMISTRIATUS	29	9	x								x										x								x			sh		
	SAPRINUS SUBNITESCENS	4	2	x								x										x								x			s		
HISTERIDAE Ergebnis		145	40	7	7	0					4	6	3	1	1						5				1		1			5	0	0	0	sh	
LAGRIIDAE	LAGRIA HIRTA	7	5		x				x								x		x					x		x							sh		
LAGRIIDAE Ergebnis		7	5	1	1	0			1								1		1		1		1	1	1							0	0	0	
LAMPYRIDAE	LAMPROHIZA SPLENDIDULA	169	45		x							x				x							x											sh	
	LAMPYRIS NOCTILUCA	5	5		x							x				x							x										s		
LAMPYRIDAE Ergebnis		174	50	2	2	0						2	2			2							2		2							0	0	0	
LATHRIDIIDAE	CARTODERE ELONGATA	92	38		x									x							x									x			sh		
	CARTODERE SEPARANDA	1	1		x									x							x									x			s		
	CORTICARIA ABIETUM	2	2		x									x							x									x			s		
	CORTICARINA GIBBOSA	5	4		x									x							x									x			sh		
	ENICMUS ANTHRACINUS	1	1		x									x							x									x			nh		
	ENICMUS BREVICORNIS	10	5		x									x							x									x			h		
	ENICMUS MINUTUS	1	1		x									x							x									x			s		
	ENICMUS RUGOSUS	2	2		x									x							x									x			nh		
	LATHRIDIDIUS NODIFER	2	2		x									x							x									x			sh		
LATHRIDIIDAE Ergebnis		116	56	9	4	5								9							9			1			4				9	0	0	0	
LUCANIDAE	DORCUS PARALLELOPIPEDUS	6	3		x																x									x			sh		
	LUCANUS CERVUS	1	1		x																x									x		4	x	s	
	PLATYCERUS CARABOIDES	2	2		x																									x			h		
LUCANIDAE Ergebnis		9	6	3	1	2																	2	2	1	1	1	1				3	1	1	0
LYCIDAE	HOMALISUS FONTISBELLAQUEI	3	2		x																													nh	
LYCIDAE Ergebnis		3	2	1	1	0																										0	0	0	
LYCTIDAE	LYCTUS BRUNNEUS	2	1		x																													nh	
	TROGOXYLON IMPRESSUM	6	2		x																													nh	
LYCTIDAE Ergebnis		8	3	2	0	2																										0	0	0	

die lokale Häufigkeit ist rein subjektiv bemessen

*nicht quantitativ erfasste Freilandbeobachtungen

MONTIGGL 1992 - 1996 BIOLOGISCHE UND ÖKOLOGISCHE HINWEISE

AUFSCHLÜSSELUNG DER GEFANGENEN ARTEN										BIOLOGISCHE UND ÖKOLOGISCHE HINWEISE																									
FAMILY	SPECIES	gefangene Exemplare	Anzahl der Fänge	Arten pro Familie	eurytpe Art	stenotpe Art	polytpe Art	xytrophage Art	phytrophage Art	pollenophage Art	coprophage Art	necrophage Art	carnivore Art	mycetophage Art	entomophage Art	Nahrungsspezialist	xerophile Art	hygrophile Art	thermophile Art	saprophile Art	phileophile Art	arbitale Art	corticole Art	floricole - herbicole Art	silvicole Art	succicole Art	pratitcole Art	humitcole Art	detriticole Art	Rote Liste Südtirols	bemerkenswerte Funde	Neurund	lokale Häufigkeit		
MALACHIIDAE	MALACHIUS AENEUS	1	1		X				X	X							X							X									s		
	MALACHIUS BIPUSTULATUS	4	4		X				X	X														X									nh		
	MALACHIUS ELEGANS	20	7			X			X	X									X					X									h		
	MALACHIUS RUBIDUS	1	1			X			X	X									X					X									s		
MALACHIIDAE Ergebnis		26	13	4	2	2	4	4	4	4							1	2						4						0	0	0	0		
MELYRIDAE	DANACAEA AMBIGUA	17	1			X			X	X								X						X									?		
	DANACAEA NIGRITARSIS	57	16			X			X	X							X	X						X									h		
	DANACAEA PALLIPES	1	1			X			X	X									X					X									h		
	DASYTES FLAVIPES	44	29			X			X	X							X	X						X									h		
	DASYTES NIGER	18	13			X			X	X							X							X									h		
	DASYTES PLUMBEUS	29	11			X			X	X								X						X									sh		
	HAPLOCNEMUS AESTIVUS	8	6			X			X	X														X									h		
	HAPLOCNEMUS NIGRICORNIS	2	1			X			X	X														X									sh		
MELYRIDAE Ergebnis		176	78	8	4	4	8	8	8	8							3	5					4	8	2			3			0	0	0		
MORDELLIDAE	MORDELLA ACULEATA	101	11			X			X	X									X						X								sh		
	MORDELLA BRACHYURA	57	21			X			X	X									X						X								sh		
	MORDELLA HUETHERI	3	3			X			X	X									X						X								nh		
	MORDELLA LEUCASPIS	22	6			X			X	X									X					X									h		
	MORDELLISTENA BREVICAUDA	1	1			X			X	X							X							X									s		
	MORDELLISTENA NEUWALDEGGIANA	2	2			X			X	X									X					X									s		
	MORDELLISTENA PUMILA	4	2			X			X	X									X					X									nh		
	MORDELLISTENA SECRETA	9	2			X			X	X							X		X					X									nh		
	MORDELLOCHROA TOURNIERI	1	1			X			X	X								X		X					X								nh		
	TOLIDA ARTEMISIAE	2	2			X			X	X								X		X					X								nh		
	TOMOXIA BUCEPHALA	3	2			X			X	X									X						X								nh		
	VARIIMORDA BASALIS	49	14			X			X	X								X		X					X								sh		
	VARIIMORDA BRIANTEA	1	1			X			X	X															X									s	
MORDELLIDAE Ergebnis		255	68	13	0	13	13	13	13	13							5	13							13	1					5	7	6		
MYCETOPHAGIDAE	LITARGUS CONNEXUS	212	62		X									X									X	X									sh		
	MYCETOPHAGUS QUADRIPUSTULATUS	9	8			X								X									X	X									h		

*nicht quantitativ erfasste Freilandernebungen

die lokale Häufigkeit ist rein subjektiv bemessen

MONTIGGL 1992 - 1996 BIOLOGISCHE UND ÖKOLOGISCHE HINWEISE

AUFSCHLÜSSELUNG DER GEFANGENEN ARTEN										BIOLOGISCHE UND ÖKOLOGISCHE HINWEISE																									
FAMILY	SPECIES	gefangene Exemplare	Anzahl der Fänge	Arten pro Familie	eurytpe Art	stenotope Art	polytphage Art	xylophage Art	phytophage Art	pollenophage Art	coprophage Art	necrophage Art	carnivore Art	mycetophage Art	entomophage Art	Nahrungsspezialist	xerophile Art	hygrophile Art	thermophile Art	saprophile Art	pholeophile Art	arbiticole Art	coriticole Art	floricole - herbicole Art	silvicole Art	succicole Art	pratitcole Art	humitcole Art	detrificole Art	Rote Liste Südtirols	Bemerkenswerte Funde	Neufund	lokale Häufigkeit		
	TYPHAEA STERCOREA	2	1		x									x								x	x	x	x	x			x	1	x		un		
MYCETOPHAGIDAE Ergebnis		223	71	3	2	1								3			x						3	3		3			1	1	0	0	0		
NITIDULIDAE	AMPHOTIS MARGINATA	9	4			x																											nh		
	CRYPTARCHA STRIGATA	1	1			x																											?		
	EPUREA FUSCICOLLIS	24	2			x															x												h		
	EPUREA LIMBATA	2	1			x								x																			?		
	GLISCHROCHILUS HORTENSIS	4	4			x																											h		
	GLISCHROCHILUS QUADRIPUNCTATUS	1	1			x																											s		
	PITYOPHAGUS FERRUGINEUS	10	9			x																											sh		
	POCADIVUS FERRUGINEUS	9	7			x																											h		
	SORONIA GRISEA	14	5			x																											h		
	THALYCRA FERVIDA	1	1			x																												?	
NITIDULIDAE Ergebnis		75	35	10	6	4	1							3	1	1					1	1	5	1	6	1	5	6		3	3	0			
OEDEMERIDAE	CHRYSAANTHIA NIGRICORNIS	94	19			x			x	x																								sh	
	CHRYSAANTHIA VIRIDISSIMA	1	1			x			x	x																								s	
	OEDEMERIA FEMORATA	3	3			x			x	x																								nh	
	OEDEMERIA FLAVIPES	14	10			x			x	x																								h	
	OEDEMERIA PODAGRARIAE	27	12			x			x	x																								h	
	XANTHOCHROA CARNIOLICA	371	99			x			x	x																								sh	
OEDEMERIDAE Ergebnis		510	144	6	1	5			6	6							1			4	1	1	1	6	1	5	6	5		0	0	0			
OSTOMIDAE	NEMOSOMA ELONGATUM	178	42			x																												sh	
OSTOMIDAE Ergebnis		178	42	1	1	0								1																		0	0		
PLATYPODIDAE	PLATYPUS CYLINDRUS	1	1			x																												s	
PLATYPODIDAE Ergebnis		1	1	1	0	1																										1	1	0	
PSELAPHIDAE	TYRUS MUCRONATUS	1	1			x																												s	
PSELAPHIDAE Ergebnis		1	1	1	1	0													1													0	0		
PTINIDAE	PTINUS BIDENS	174	90			x																												sh	
	PTINUS CLAVIPES	1	1			x																												s	
	PTINUS RAPTOR	4	3			x																												nh	
	PTINUS RUFIPES	2	2			x																												nh	

*nicht quantitativ erfasste Freilandbeobachtungen

die lokale Häufigkeit ist rein subjektiv bemessen

MONTIGGL 1992 - 1996 BIOLOGISCHE UND ÖKOLOGISCHE HINWEISE

AUFSCHLÜSSELUNG DER GEFANGENEN ARTEN										BIOLOGISCHE UND ÖKOLOGISCHE HINWEISE																								
FAMILY	SPECIES	gefangene Exemplare	Anzahl der Fänge	Arten pro Familie	eur. Art	stenot. Art	polyphage Art	xylophage Art	phytophage Art	pollenophage Art	coprophage Art	necrophage Art	carnivore Art	mycetophage Art	entomophage Art	Nahrungsspezialist	xerophile Art	hygrophile Art	thermophile Art	saprophile Art	pholeophile Art	arbit. Art	cor. Art	floricole - herbicole Art	silvicol. Art	succicol. Art	humicol. Art	detriticol. Art	Rote Liste Südtirols	Bemerkenswerte Funde	Neufund	lokale Häufigkeit		
PTINIDAE Ergebnis	PTINUS SEXPUNCTATUS	3	2		x												2			2		2			2	1			3	0	0	0	h	
	RABOCERUS GABRIELI	1	1		x										x								x	x	x	x							s	
	RHINOSIMUS PLANIROSTRIS	49	24		x										x							x	x	x	x								h	
	RHINOSIMUS RUFICOLLIS	7	6			x									x							x	x	x	x								h	
	SALPINGUS CASTANEUS	7	3			x										x						x	x	x	x								sh	
PYTHIDAE Ergebnis	VINCENZELLUS RUFICOLLIS	3	3		x																	x	x	x	x								h	
		67	37	6	1	5									6								6	6	6	6				0	0	0	0	h
	RHIZOPHAGUS BIPUSTULATUS	45	21		x											x						x	x	x	x								sh	
	RHIZOPHAGUS DEPRESSUS	122	33		x											x						x	x	x	x								nh	
	RHIZOPHAGUS DISPAR	11	9		x											x						x	x	x	x								s	
RHIZOPHAGIDAE Ergebnis	RHIZOPHAGUS FERRUGINEUS	1	1		x											x						x	x	x	x								s	
	RHIZOPHAGUS NITIDULUS	4	2		x											x						x	x	x	x								nh	
	RHIZOPHAGUS PICIPES	7	5		x											x						x	x	x	x								nh	
		190	71	6	6	0									1	5			1		1		6	6	6	5				1	0	0	0	nh
	SCAPHIDIUM QUADRIMACULATUM	9	9		x										x									x		x								nh
SCAPHIDIIDAE Ergebnis		9	9	1	1	0									1									1		1				0	0	0	0	nh
		9	9	1	1	0									1									1		1				0	0	0	0	nh
SCARABAEIDAE	AMPHIMALLON ASSIMILE	19	9		x				x									x							x									sh
	AMPHIMALLON SOLSTITIALE	3	2		x				x													x												h
	ANISOPLIA VILLOSA	1	1			x			x																									s
	ANOXIA MATUDINALIS	1	1			x			x																									s
	APHODIUS FIMETARIUS	1	1		x				x																									s
	APHODIUS STICTICUS	1	1		x				x																									s
	APHODIUS ZENKERI	2	2		x				x																									nh
	CETONIA AURATA	5	3		x				x																									h
	GEOTRUPES PYRENAEUS	1	1		x				x																									s
	GEOTRUPES STERCOROSUS	4	3		x				x																									nh
	HOPLIA ARGENTATA	24	12			x			x																									sh
	MELOLONTHA MELOLONTHA	1	1		x				x																									nh
	MIMELIA JUNII	1	1			x			x																									nh

*nicht quantitativ erfaßte Freilandbeobachtungen

die lokale Häufigkeit ist rein subjektiv bemessen

MONTIGGL 1992 - 1996 BIOLOGISCHE UND ÖKOLOGISCHE HINWEISE

AUFSCHLÜSSELUNG DER GEFANGENEN ARTEN					BIOLOGISCHE UND ÖKOLOGISCHE HINWEISE																												
FAMILY	SPECIES	gefangene Exemplare	Anzahl der Fänge	Arten pro Familie	eurytpe Art	stenotpe Art	polytpe Art	xylophage Art	phytophage Art	pollenophage Art	coprophage Art	necrophage Art	carnivore Art	mycetophage Art	entomophage Art	Nahrungsspezialist	xerophile Art	hygrophile Art	thermophile Art	saprophile Art	phileophile Art	arbitrale Art	corticole Art	floricole - herbicole Art	silvicole Art	succicole Art	pratense Art	humicole Art	detriticole Art	Rote Liste Südteils	bermerkenswerte Funde	Neufund	lokale Häufigkeit
	ODONTAEUS ARMIGER	5	5														x	x												4	x	s	
	ONTHOPHAGUS COENOBITA	58	14		x						x																			3	x	sh	
	ONTHOPHAGUS JOANNAE	391	38		x						x	x																				sh	
	ONTHOPHAGUS OVATUS	3	3		x						x	x																		4	x	nh	
	ORYCTES NASICORNIS	3	3			x			x																					4	x	s	
	OXYTHYREA FUNESTA	7	5			x			x																							h	
	POLYPHYLLA FULLO	6	5			x			x																					4		nh	
	POTOSIA CUPREA	3	3		x				x																							nh	
	POTOSIA MORIO	10	9			x			x																							nh	
	RHIZOTROGUS INSUBRICUS	8	3			x			x																							h	
	SERICA BRUNNEA	11	7			x			x																							sh	
	TRICHIUS ZONATUS	13	6			x			x																						4	x	nh
	TROPINOTA HIRTA	1	1						x																						4	x	nh
	TROX SCABER	6	5		x							x																			4	x	nh
	VALGUS HEMIPTERUS	13	2		x				x																						4	x	h
SCARABAEIDAE Ergebnis					602	147	28	12	16			18	8	9	6		12	15	3	7	14	1	12	2	4	7	1	2	11	12	2		
SCOLYTIDAE	BLASTOPHAGUS MINOR	11	11			x		x	x																								sh
	BLASTOPHAGUS PINIPERDA	2	2			x		x	x																								h
	CARPHOBORUS MINIMUS	1	1			x		x	x																								nh
	CRYPTURGUS CINEREUS	20	1			x		x	x																								h
	DRYOCOETES VILLOSUM	2	1			x		x	x																								nh
	HYLASTES ATER	1	1			x		x	x																								s
	HYLESINUS OLEIPERDA	23	4			x		x	x																								sh
	IPS TYPOGRAPHUS	469	110			x		x	x																								sh
	LEPERISINUS VARIUS	1	1			x		x	x																								nh
	PITYOGENES BISTRIDENTATUS	1	1			x		x	x																								nh
	PITYOGENES CHALCHOGRAPHUS	27288	108		x			x	x																								sh
	PITYOGENES QUADRIDENS	10	1			x		x	x																								h
	SCOLYTUS INTRICATUS	138	48		x			x	x																								sh
	SCOLYTUS MULTISTRIATUS	5	4			x		x	x																								h

*nicht quantitativ erfasste Freilandernhebungen

die lokale Häufigkeit ist rein subjektiv bemessen

MONTIGGL 1992 - 1996 BIOLOGISCHE UND ÖKOLOGISCHE HINWEISE

AUFSCHLÜSSELUNG DER GEFANGENEN ARTEN										BIOLOGISCHE UND ÖKOLOGISCHE HINWEISE																								
FAMILY	SPECIES	gefangene Exemplare	Anzahl der Fänge	Arten pro Familie	eurypae Art	stenotopae Art	polyphage Art	xylophage Art	phytophage Art	pollenophage Art	ceprophage Art	neocrophage Art	carnivore Art	mycetophage Art	entomophage Art	Nahrungsspezialist	xerophile Art	hygrophile Art	thermophile Art	saprophile Art	phileophile Art	arbitrale Art	coricole Art	floricole - herbicole Art	silvicole Art	succicole Art	praticole Art	humicole Art	detrificole Art	Rote Liste Südtirols	Bemerkenswerte Funde	Neufund	lokale Häufigkeit	
SCOLYTIDAE Ergebnis	SCOLYTUS PYGMAEUS	1	1			x		x	x													x	x										s	
	SCOLYTUS RUGULOSUS	43	25		x			x	x													x	x										h	
	SCOLYTUS SULCIFRONS	2	2			x		x	x													x	x										s	
	TRYPOPHLOEUS ASPERATUS	1	1			x		x	x													x	x										s	
	XYLEBORUS DISPAR	1893	186		x			x	x													x	x										sh	
	XYLEBORUS MONOGRAPHUS	368	81			x		x	x													x	x										sh	
	XYLEBORUS SAXESENII	4252	193		x			x	x													x	x										sh	
	XYLOCLEPTES BISPINUS	1	1			x		x	x													x	x										nh	
	XYLOTERUS LINEATUS	1804	110		x				x	x												x	x											sh
			36337	894	23	8 15			23	23													23	23			23				0	0	0	
SCRAPTIIDAE	ANASPIIS FLAVA	1	1		x				x									x					x								5	x		?
	ANASPIIS FRONTALIS	1	1		x				x										x				x											?
	SCRAPTIA FERRUGINEA	2	2			x				x													x	x										?
SCRAPTIIDAE Ergebnis		4	2	3	1 1			1	2	2							1	2				2	1	1						1	1	1	0	
SCYDMAENIDAE	STENICHNUS COLLARIS	1	1		x																												s	
SCYDMAENIDAE Ergebnis		1	1	1	1	0								1							1						1				0	0	0	
SERROPALPIDAE	ABDERA QUADRIFASCIATA	1	1		x																	x	x											s
	ORCHESIA MICANS	1	1		x																												s	
	OSPHYA AENEIPENNIS	9	4		x														x			x	x										nh	
	PHLOEOTRYA RUFIPE	1	1		x															x		x	x										s	
	PHLOEOTRYA VAUDOUERI	25	5		x															x													h	
SERROPALPIDAE Ergebnis		37	12	5	0 5					2				2					3			3	1	2	3					1	0	0	1	
SILPHIDAE	NECRODES LITTORALIS	46	15		x													x																h
	NECROPHORUS FOSSOR	224	13		x																										4		sh	
	NECROPHORUS HUMATOR	3	2		x																x										4		s	
	NECROPHORUS INVESTIGATOR	2	1		x																x												s	
	OECOPTOMA THORACICA	8	4		x																x													nh
SILPHIDAE Ergebnis		283	35	5	5 0						2	5	3		1	1	1	1	1	3											3	0	1	
STAPHYLINIDAE	ACROTONA MUSCORUM	1	1																															
	ALEOCHARA CURTULA	78	25																															

*nicht quantitativ erfasste Freilandbeobachtungen

die lokale Häufigkeit ist rein subjektiv bemessen

MONTIGGL 1992 - 1996 BIOLOGISCHE UND ÖKOLOGISCHE HINWEISE

AUFSCHLÜSSELUNG DER GEFANGENEN ARTEN					BIOLOGISCHE UND ÖKOLOGISCHE HINWEISE																												
FAMILY	SPECIES	gefangene Exemplare	Anzahl der Fänge	Arten pro Familie	eurytpe Art	stenotope Art	polyphage Art	xylophage Art	phylophage Art	pollenophage Art	coprophage Art	necrophage Art	carnivore Art	mycetophage Art	entomophage Art	Nahrungsspezialist	xerophile Art	hygrophile Art	thermophile Art	saprophile Art	pholeophile Art	arbkole Art	corticole Art	floricole - herbicole Art	silvicole Art	succicole Art	prat�icole Art	humicole Art	destriticol Art	Rote Liste Südtirols	bemerkenswerte Funde	Neufund	lokale Häufigkeit
	ALEOCHARA LATA	1	1																														
	ALEOCHARA LATICORNIS	37	15																														
	ALEOCHARA LYGAEA	2	1																														
	ALEOCHARA PEEZIANA	18	8																														
	ALEOCHARA SP.(DANNEGG.)	1	1																														
	ALEOCHARA SPARSA	254	47																														
	ALEOCHARA STICHAI	14	5																														
	ANOTYLUS SP.	4	2																														
	ATHETA CRASSICORNIS	131	62																														
	ATHETA CRASSICORNIS ?	1	1																														
	ATHETA FUNGI	45	13																														
	ATHETA GAGATINA	286	76																														
	ATHETA HYBRIDA	18	9																														
	ATHETA MARCIDA	10	4																														
	ATHETA NIGRA	3	3																														
	ATHETA NIGRITULA	79	41																														
	ATHETA PERVAGATA	77	22																														
	ATHETA SP.	8	3																														
	ATHETA SP. (DANNEGG.)	7	7																														
	ATHETA VAGA	15	13																														
	AUTALIA RIVULARIS	2	2																														
	BISNIUS FUSCUS	1	1																														
	BISNIUS SUBULIFORMIS	8	6																														
	BOLITOCARA PULCHRA	4	2																														
	CARPHACIS STRIATUS	1	1																														
	CONOSOMA IMMACULATUM	1	1																														
	DELEASTER DICHROUS	2	2																														
	DINOTHENARUS PUBESCENS	1	1																														
	EURYUSA OPTABILIS	1	1																														
	GABRIUS SPLENDIDULUS	3	3																														

*nicht quantitativ erfasste Freilandernhebungen

die lokale Häufigkeit ist rein subjektiv bemessen

MONTIGGL 1992 - 1996 BIOLOGISCHE UND ÖKOLOGISCHE HINWEISE

AUFSCHLÜSSELUNG DER GEFANGENEN ARTEN					BIOLOGISCHE UND ÖKOLOGISCHE HINWEISE																												
FAMILY	SPECIES	gefangene Exemplare	Anzahl der Fänge	Arten pro Familie	eurytpe Art	stenotope Art	polyphage Art	xylophage Art	phytophage Art	pollenophage Art	coprophage Art	necrophage Art	carnivore Art	mycetophage Art	entomophage Art	Nahrungsspezialist	xerophile Art	hygrophile Art	thermophile Art	saprophile Art	phloeophile Art	arbitcole Art	corticole Art	floricole - herbicole Art	silvicole Art	succicole Art	praticole Art	humicole Art	detrificole Art	Rote Liste Südtirols	bemerkenswerte Funde	Neufund	lokale Häufigkeit
	GYROHYPNUS ANGUSTATUS	1	1																														
	HESPERUS RUFIPENNIS	3	2																														
	LORDITHON EXOLETUS	12	10																														
	LORDITHON LUNULATUS	1	1																														
	LORDITHON THORACICUS	9	6																														
	LORDITHON TRINOTATUS	22	14																														
	MEDONDILUTUS ?	1	1																														
	MYCETOPHORUS SP.	1	1																														
	OCYPUS COMPRESSUS	7	6																														
	OCYPUS FULVIPENNIS	2	2																														
	OCYPUS OLENS	4	3																														
	OCYPUS TENEBRICOSUS	2	2																														
	OMALIUM EXCAVATUM	2	2																														
	OMALIUM RIVULARE	4	2																														
	ONTHOLESTES MURINUS	8	5																														
	OTHIOUS PUNCTULATUS	3	3																														
	OXYPODA ALTERNANS	369	49																														
	OXYPODA FORMOSA	1	1																														
	OXYPODA OPACA	2	2																														
	OXYPODA SP. (DANNEGG.)	1	1																														
	PHILONTHUS PSEUDOVARIANS	1	1																														
	PHILONTHUS SUBULIFORMIS	1	1																														
	PHILONTHUS SUCCICOLA	121	44																														
	PHILONTHUS VARIANS	20	13																														
	PHILONTHUS DEBILIS	1	1																														
	PHLOEONOMUS PUNCTIPENNIS	1	1																														
	PHLOEOPORA SP.	8	7																														
PHLOEOSTIBA PLANA	7	6																															
PLACUSA ATRATA	11	4																															
PLACUSA DEPRESSA	1	1																															

*nicht quantitativ erfasste Freilandenthebungen

die lokale Häufigkeit ist rein subjektiv bemessen

MONTIGGL 1992 - 1996 BIOLOGISCHE UND ÖKOLOGISCHE HINWEISE

AUFSCHLÜSSELUNG DER GEFANGENEN ARTEN										BIOLOGISCHE UND ÖKOLOGISCHE HINWEISE																											
FAMILY	SPECIES	gefangene Exemplare	Anzahl der Fänge	Arten pro Familie	eurypa Art	stenotopa Art	polyphaga Art	xylophaga Art	phytophaga Art	pollenophaga Art	coprophaga Art	necrophaga Art	carnivore Art	mycetophaga Art	entomophaga Art	Nahrungsspezialist	xerophile Art	hygrophile Art	thermophile Art	saprophile Art	phileophile Art	arbkole Art	corbkole Art	florbkole - herbkbcol Art	silvbkcol Art	succbkcol Art	pratikcol Art	humikcol Art	detrifikcol Art	Rote Liste Südtirols	Bemerkenswerte Funde	Neufund	lokale Häufigkeit				
	PLACUSA PUMILIO	1	1																																		
	PLACUSA TACHYPOROIDES	4	3																																		
	PROTEINUS BRACHYPTERUS	1	1																																		
	PROTEINUS LONGICORNIS	1	1																																		
	QUEDIUS CRUENTUS	16	11																																		
	QUEDIUS DUBIUS	1	1																																		
	QUEDIUS LATINUS	44	8																																		
	QUEDIUS MAURUS	1	1																																		
	QUEDIUS MESOMELINUS	12	11																																		
	QUEDIUS MESOMELINUS SKOR.	1	1																																		
	QUEDIUS NEMORALIS	6	5																																		
	QUEDIUS PARADISIANUS	5	1																																		
	RUGILUS RUFIPES	1	1																																		
	SCOPAEUS SULCICOLLIS	1	1																																		
	SEPEDOPHILUS LITTOREUS	1	1																																		
	SEPEDOPHILUS MARSHAMI	12	9																																		
	SEPEDOPHILUS NIGRIPENNIS	1	1																																		
	SEPEDOPHILUS TESTACEUS	1	1																																		
	TACHINUS HUMERALIS	2	2																																		
	TACHINUS RUFIPES	1	1																																		
	THAMIAREA CINNAMOMEA	42	14																																		
	TINOTUS MORION	1	1																																		
	XANTHOLINUS LINEARIS	6	6																																		
ZYRAS COGNATUS	3	2																																			
ZYRAS HUMERALIS	13	2																																			
ZYRAS LUGENS	5	1																																			
STAPHYLINIDAE Ergebnis		1924	661	97																																	
TENEBRIONIDAE	ALPHITOBIVS DIAPARINUS	4	2																																		
	ASIDA SABULOSA	2	2																																		
	DIACLINA FAGI	1	1																																		

die lokale Häufigkeit ist rein subjektiv bemessen

*nicht quantitativ erfasste Freilandernhebungen

AUFSCHÜSSELUNG DER GEFANGENEN ARTEN			BIOLOGISCHE UND ÖKOLOGISCHE HINWEISE																														
FAMILY	SPECIES	gefangene Exemplare	Anzahl der Fänge	Arten pro Familie	eurytpe Art	stenotope Art	polyphage Art	xylophage Art	phytophage Art	pollenophage Art	coprophage Art	necrophage Art	carnivore Art	mycetophage Art	entomophage Art	Nahrungsspezialist	xerophile Art	hygrophile Art	thermophile Art	saprophile Art	pholeophile Art	arbitale Art	corrticale Art	florrticale - herbtticale Art	silvtticale Art	succetticale Art	pratttticale Art	humtticale Art	detrttitticale Art	Rote Liste Südtttirols	bemertkenswerte Funde	Neufund	lokale Häufigkeit
	HYPHLOEUS LINEARIS	1	1		X											X						X											
	HYPHLOEUS LONGULUS	2	2		X											X						X											
	HYPHLOEUS RUFULUS	1	1		X											X						X											
	MENEPIHILUS CYLINDRICUS	1	1		X											X						X											
	PLATYDEMA VIOLACEUM	7	2		X											X						X											
	SCAPHIDEMA METALLICUM	10	5		X											X						X											
	STENOMAX AENEUS	20	6		X											X						X											
	ULOMA CULINARIS	4	4		X											X						X											
	ULOMA RUFA	3	3		X											X						X											
TENERBRIONIDAE Ergebnis		56	30	12	1	11									4	7	3	1		1	2	1	5	9				2	5	3	1	0	
Gesamtergebnis - Montiggi		45.754	4.304	556	197	243	1								40	55	3	71	17	113	35	49	207	143	132	200	18	18	8	71	65	68	14

RITTEN 1992 - 1996 BIOLOGISCHE UND ÖKOLOGISCHE HINWEISE

AUFSCHLÜSSELUNG DER GEFANGENEN ARTEN					BIOLOGISCHE UND ÖKOLOGISCHE HINWEISE																													
FAMILY	SPECIES	gefangene Exemplare	Anzahl der Fänge	Arten pro Familie	eurytope Art	stenotope Art	polyphage Art	xylophage Art	phytophage Art	muscophage Art	coprophage Art	necrophage Art	carnivore Art	mycetophage Art	entomophage Art	Nahrungsspezialist	xerophile Art	hygrophile Art	thermophile Art	saprophile Art	phileophile Art	arbkole Art	corbkole Art	florikole - herbikole Art	silvikole Art	succikole Art	pratikole Art	humikole Art	detritikole Art	Rote Liste Südtirols	Bemerkenswerte Funde	Neufund	Häufigkeitskategorie	
ANOBIIDAE	DRYOPHILUS PUSILLUS	1	1				x	x	x													x	6	1	5									nh
	EPISERNUS ANGUSTICOLLIS	3	1			x	x	x	x													x	x								4	x	s	
	EPISERNUS GENTILIS	*	1			x	x	x	x													x	x										h	
	ERNOBIUS ABIETIS	3	3			x	x	x	x													x	x								4	x	h	
	ERNOBIUS ANGUSTICOLLIS	1	1			x	x	x	x													x	x										nh	
	ERNOBIUS MOLLIS	*	1		x		x	x	x													x	x										sh	
ANOBIIDAE Ergebnis		8	8	6	1	4	6	6	6													1	1							2	2	0		
ANTHRIBIDAE	BRACHYTARSUS NEBULOSUS	3	3		x												x					1											h	
ANTHRIBIDAE Ergebnis		3	3	1	1	0	1	1	1								1					1									0	0	0	
BUPRESTIDAE	ANTHAXIA GODETI	2	2		x		x	x	x																								h	
	ANTHAXIA HELVETICA	15	12		x		x	x	x																								sh	
	ANTHAXIA MORIO	1	2		x		x	x	x																								nh	
	ANTHAXIA QUADRIPUNCTATA	14	7		x		x	x	x																								sh	
	BUPRESTIS HAEMORRHODIALIS	*	1				x	x	x													x	x									h		
	CHRYSOBATHRIS SOLIERI	*	1				x	x	x													x	x										h	
	PHAENOPS FORMANEKI	*	1				x	x	x													x											nh	
BUPRESTIDAE Ergebnis		32	26	7	4	3	7	7	4													3	4	4						0	0	0	h	
BYRRHIDAE	BYRRHUS GIGAS	9	8		x					x																							h	
	BYRRHUS SIGNATUS	1	1		x					x																							s	
	PEDILOPHORUS AURATUS	1	1			x				x																							s	
BYRRHIDAE Ergebnis		10	9	3	2	1				3																					0	0	0	
BYTURIDAE	BYTURUS AESTIVUS	*	1		x		x																										h	
BYTURIDAE Ergebnis		*	1	1	1	0	1	1	1																						0	0	0	
CANTHARIDAE	MALTHINUS BIGUTTATUS	1	1		x		x	x	x																								nh	
	PODABRUS ALPINUS	3	3		x		x	x	x																								h	
CANTHARIDAE Ergebnis		4	4	2	2		2	2	2																						0	0	0	
CARABIDAE	ABAX EXARATUS	6	5		x																												nh	
	ABAX PARALLELEPIPEDUS	15	14		x																												h	
	AGONUM VIDUUM	*	1		x																												sp?	
	AMARA AENEAE	*	1		x																												h	
	AMARA ERRATICA	2	2		x																												nh	
	AMARA NIGRICORNIS	1	1		x																												s	
	AMARA NITIDA	*	1		x																												?	
	ASAPHIDION PALLIPES	*	1		x																											4	x	?
	BEMBIDION LAMPROS	*	1		x																													?
	BEMBIDION RUFICORNE	*	1		x																													?

die lokale Häufigkeit ist rein subjektiv bemessen

* nicht quantitativ erfasste Freilandbeobachtungen

die lokale Häufigkeit ist rein subjektiv bemessen

RITTEN 1992 - 1996 BIOLOGISCHE UND ÖKOLOGISCHE HINWEISE

AUFSCHLÜSSELUNG DER GEFANGENEN ARTEN					BIOLOGISCHE UND ÖKOLOGISCHE HINWEISE																												
FAMILY	SPECIES	gefangene Exemplare	Anzahl der Fänge	Arten pro Familie	eurytome Art	stenotope Art	polyphage Art	xylophage Art	phytophage Art	muscophage Art	coprophage Art	necrophage Art	carnivore Art	mycetophage Art	entomophage Art	Nahrungsspezialist	xerophile Art	hygrophile Art	thermophile Art	saprophile Art	pholeophile Art	arbkole Art	cortikole Art	floricole - herbicole Art	silvicole Art	succicole Art	pratıcole Art	humicole Art	detriticole Art	Rote Liste Südtirols	Bemerkenswerte Funde	Neufund	Häufigkeitskategorie
	CALATHUS MELANOCEPHALUS	5	5		x								x	x	x			x											x				h
	CALATHUS MICROPTERUS	52	37		x								x	x	x			x											x				sh
	CARABUS AURONITENS	6	6		x								x	x	x																x		nh
	CARABUS CONVEXUS	1	1		x								x	x	x				x														s
	CARABUS CORIAEUS	5	4		x								x	x	x															x			h
	CARABUS GERMARI	39	32		x								x	x	x															x			sh
	CARABUS HORTENSIS	2	2		x								x	x	x				x											x			nh
	CINCINDELA CAMPESTRIS	*	1		x								x	x	x																		nh
	CINCINDELA SILVICOLA	*	1		x								x	x	x																		nh
	CYCHRUS CARABOIDES	2	2		x									x		x			x	x													ss
	CYCHRUS ITALICUS	2	1			x							x	x					x														nh
	CYMINDIS VAPORARIORUM	1	1		x									x		x																	s
	DROMIUS AGILIS	3	3		x									x		x																	h
	DROMIUS FENESTRATUS	*	1		x									x		x																	h
	DROMIUS QUADRIMACULATUS	*	1		x									x		x																	h
	LICINUS HOFFMANNSEGGI	*	1		x									x		x																	?
	MOLOPS PICEUS	*	1			x										x			x														s
	NOTIOPHILUS AQUATICUS	2	2		x														x														nh
	NOTIOPHILUS BIGUTTATUS	11	10		x									x																			sh
	PLATYDERUS RUFUS	2	2		x									x		x			x														nh
	PTEROSTICHUS AETHIOPS	*	1		x									x		x																	s
	PTEROSTICHUS JURINEI	1275	286		x									x		x																	sh
	PTEROSTICHUS MELANURIUS	1	1		x									x		x			x														s
PTEROSTICHUS METALLICUS	341	161		x									x		x			x														sh	
PTEROSTICHUS MULTIPUNCTATUS	9	1		x									x		x																	h?	
PTEROSTICHUS NIGER	1	1		x									x		x			x														s	
PTEROSTICHUS SUBSINUATUS	12	11		x									x		x																	ss	
PTEROSTICHUS UNCTULATUS	1170	266		x									x		x																	sh	
STOMIS ROSTRATUS	*	1			x								x		x			x														s	
SYNUCHUS NIVALIS	3	3		x									x		x																	h	
TACHYTA NANA	*	1				x							x		x																	h	
TRECHUS OPTUSUS	1	1		x									x		x			x														nh	
CARABIDAE Ergebnis		2970	876	42	35	7				2			40	38	38		10	20	3				3	5		23	5	4	8	8	0		nh
CATOPIIDAE	CATOPS CORACINUS	8	3		x						x																						nh
	CATOPS NEGLECTUS	1	1		x																												nh
	CATOPS NIGRITA	75	34		x																												sh

* nicht quantitativ erfasste Freilandbeobachtungen

Die lokale Häufigkeit ist rein subjektiv bemessen

RITTEN 1992 - 1996 BIOLOGISCHE UND ÖKOLOGISCHE HINWEISE

AUFSCHLÜSSELUNG DER GEFANGENEN ARTEN										BIOLOGISCHE UND ÖKOLOGISCHE HINWEISE																								
FAMILY	SPECIES	gefangene Exemplare	Anzahl der Fänge	Arten pro Familie	eurytpe Art	stenotope Art	polyphage Art	xylophage Art	phytophage Art	pollenophage Art	muscophage Art	coprophage Art	necrophage Art	carnivore Art	mycetophage Art	entomophage Art	Nahrungsspezialist	xerophile Art	hygrophile Art	thermophile Art	saprophile Art	phileophile Art	arbkole Art	cortikole Art	floricole - herbikole Art	silvikole Art	succicole Art	pratcicole Art	humicole Art	detriticole Art	Rote Liste Südtirols	bemerkenswerte Funde	Neufund	Häufigkeitskategorie
CATOPIIDAE Ergebnis CERAMBYCIDAE	CATOPS SUBFUSCUS	15	10		x						x	x									x												sh	
	DREPOSCIA SP.(RELICTA?)	3	1			x															x												?	
	SCIODREPOIDES WATSONI	1	1		x							x	x								x												h	
		103	50	5	5	1						4	5								6						2	1					x	ss
	ACMAEOPS PRATENSIS	1	1			x		x	x	x																x							h	
	ALOSTERNA TABACICOLOR	*	1		x			x	x	x																x							h	
	CALLIDIUM AENEUM	1	2			x		x	x	x																							nh	
	CLYTUS LAMA	*	1			x		x	x	x																							nh	
	CRIOCEPHALUS RUSTICUS	4	2		x			x	x	x																							s	
	EVODINUS CLATHRATUS	*	1					x	x	x																							sh	
	GAUROTUS VIRGINEA	3	3			x		x	x	x																							sh	
	JUDOLIA CERAMBYCIFORMIS	*	1		x			x	x	x																							sh	
	LEPTURA DUBIA	*	1					x	x	x																							h	
	LEPTURA HYBRIDA	1	1			x		x	x	x																							nh	
	LEPTURA INEXSPECTATA	*	1					x	x	x																							ss	
	LEPTURA LIVIDA	4	3		x			x	x	x																							h	
	LEPTURA MACULICORNIS	*	1			x		x	x	x																							sh	
	LEPTURA RUBRA	1	1			x		x	x	x																							h	
	LEPTURA SANGUINOLENTA	1	1				x		x	x																							h	
	MOLOCHUS MINOR	*	1			x			x	x																							sh	
	MONOCHAMUS SARTOR	*	1					x	x	x																							nh	
	MONOCHAMUS SUTOR	*	1			x		x	x	x																							nh	
	OBRIUM BRUNNEUM	*	1				x		x	x																							h	
	PACHYTA QUADRIMACULATA	*	1				x		x	x																							sh	
	PIDONIA LURIDA	1	2		x			x	x	x																							h	
	POGONOCHEUS FASCICULATUS	*	1				x		x	x																							nh	
	RHAGIUM INQUISITOR	6	3			x		x	x	x																							h	
	STRANGALIA BIFASCIATA	*	1				x		x	x																							nh	
	STRANGALIA MACULATA	*	1					x	x	x																							sh	
STRANGALIA MELANURA	1	1			x		x	x	x																							h		
TETROPIUM CASTANEUM	*	1				x		x	x																							h		
TETROPIUM GABRIELI	*	1				x		x	x																							s		
TOXOTUS CURSOR	1	1			x		x	x	x																							nh		
CERAMBYCIDAE Ergebnis		25	38	29	10	19	29	29	21									2		2				15	3	21	17	8	11	1	0	1	0	
CHRYSOMELIDAE	CHRYSOCHLOA CHACHALIAE	*	1			x			x																								h	
	CHRYSOCHLOA SPECIOSISSIMA	*	1			x			x																								h	

* nicht quantitativ erfasste Freilandbeobachtungen

die lokale Häufigkeit ist rein subjektiv bemessen!

AUFSCHLÜSSELUNG DER GEFANGENEN ARTEN					BIOLOGISCHE UND ÖKOLOGISCHE HINWEISE																														
FAMILY	SPECIES	gefangene Exemplare	Anzahl der Fänge	Arten pro Familie	eurytpe Art	stenotope Art	polyphage Art	xylotrophe Art	phytophage Art	pollenophage Art	muscophage Art	coprophage Art	necrophage Art	carnivore Art	mycetophage Art	entomophage Art	Nahrungsspezialist	xerophile Art	hygrophile Art	thermophile Art	saprophile Art	phileophile Art	arbkole Art	coritcole Art	floricole - herbicole Art	silvicolc Art	succicolc Art	praticole Art	humnicole Art	détritifcolc Art	Rote Liste Südltroirs	Bemerkenswerte Funde	Neurund	Häufigkeitskategorie	
	CHRYSOCHLOA VIRGULATA	*	1		x		x												x										x					nu	
	CHRYSOMELA GEMINATA	*	1		x																					x			x					nu	
	CRYPTOCEPHALUS AUREOLUS	9	4	x																						x			x					h	
	CRYPTOCEPHALUS BIPUNCTATUS	1	1																		x												qu		
	CRYPTOCEPHALUS HYPOCHOERIDIS	2	1		x																x												?		
	CRYPTOCEPHALUS SERICUS	1	1																		x												h		
	CRYPTOCEPHALUS VIOLACEUS	1	1		x																x												?		
	GASTROIDEA VIRIDULA	1	1		x																												nh		
	GYMNANDROPTHALMA AURITA	1	1			x															x													h	
	LUPERUS PINICOLA	1	1		x																													h	
	LUPERUS VIRIDIPENNIS	1	1			x																												?	
	ORSODACNE CERASI	*	1			x															x													?	
	PHYLLODECTA TIBIALIS	*	1			x														x														?	
	CHRYSOMELIDAE Ergebnis				18	18	15	5	10	15									5	1	5	1	7		6	2	8			0	0	0			
CLERIDAE	THANASIMUS PECTORALIS	*	1		x												x																	s	
	THANASIMUS FORMICARIUS	56	26	x													x																	sh	
CLERIDAE Ergebnis					56	27	2	2	0							2								2	2	2					0	0	0		
COCCINELLIDAE	ADALIA BIPUNCTATA	*	1		x												x																	sh	
	ADALIA CONGLOMERATA	1	1			x											x																	?	
	COCCINELLA SEPTEMPUNCTATA	1	1		x												x																	h	
	HARMONIA QUADRIPUNCTATA	*	1			x											x																	h	
	SEMIADALIA NOTATA	2	2			x											x																	h	
	COCCINELLIDAE Ergebnis				4	6	5	2	3							5	1							4	1	1	3	3			1	1	0		
COLYDIIDAE	CERYLON HISTEROIDES	*	1		x																													h	
	COXELUS PICTUS	1	1			x																												sh	
COLYDIIDAE Ergebnis					1	2	2	1	1														2	2	2					1	0	0	0		
CUCUJIDAE	LAEMOPHLOEUS TESTACEUS	*	1			x											x																		sh
	MONOTOMA PICIPES	*	1			x																												nh	
	SILVANOPRUS FAGI	*	1			x											x																	h	
	CUCUJIDAE Ergebnis				*	3	3	2	1							2								2	2	2	2				0	0	0		
CURCULIONIDAE	HYLOBIUS ABIETIS	132	82		x																														sh
	HYLOBIUS PICEUS	2	2		x																													nh	
	OTIORHYNCHUS GEMMATUS	2	2			x																												h	
	CURCULIONIDAE Ergebnis				133	86	3	1	2	2	3													2						1	0	0	0		
DERMESTIDAE	MEGATOMA UNDATA	2	2			x																												h	
	DERMESTIDAE Ergebnis				2	2	1	1	0																							0	0	0	

MITTEN 1992 - 1996 BIOLOGISCHE UND ÖKOLOGISCHE HINWEISE

AUFSCHLÜSSELUNG DER GEFANGENEN ARTEN										BIOLOGISCHE UND ÖKOLOGISCHE HINWEISE																								
FAMILY	SPECIES	gefangene Exemplare	Anzahl der Fänge	Arten pro Familie	eurytome Art	stenotome Art	polytome Art	xylophage Art	phytophage Art	pollenophage Art	muscophage Art	coprophage Art	necrophage Art	carnivore Art	mycetophage Art	entomophage Art	Nahrungsspezialist	xerophile Art	hygrophile Art	thermophile Art	saprophile Art	phileophile Art	arbkole Art	corbkole Art	florikole - herbikole Art	silvikole Art	succicole Art	pratikole Art	humikole Art	detritikole Art	Rote Liste Südtirols	Bemerkenswerte Funde	Neufund	Häufigkeitskategorie
ELATERIDAE	AGRYPNUS MURINUS	*	1		x			x										x						x										h
	AMPEDUS AETHIOPS	9	7			x																		x										h
	AMPEDUS AURIPES	2	2			x																												s
	AMPEDUS BALTEATUS	2	2																					x										nh
	AMPEDUS SP.Nr.1	2	1																														s	
	ANOSTIRIUS PURPUREUS	*	1			x																												h
	ATHOUS HAEMORRHODALIS	*	1			x																												h
	ATHOUS SUBFUSCUS	45	23		x				x																									sh
	ATHOUS VITTATUS	4	4		x																													h
	ATHOUS ZEBEI	4	4			x			x																									h
	CARDIOPHORUS RUFICOLLIS	3	3			x													x															?
	CTENICERA CUPREA	3	3																															h
	HEMICREPIDUS NIGER	1	1			x																												nh
	LIOTRICHUS AFFINIS	1	1			x																												nh
	MELANOTUS CASTANIPES	2	2			x																												h
	PROSTERNON TESSELATUM	*	1			x																												sh
	SELATOSOMUS AENEUS	1	1			x				x																								nh
ELATERIDAE Ergebnis		79	58	17	10	6	1	3	1									2						14	2	10	10	7	4	2	3	1		?
HISTERIDAE	ATHOLUS BIMACULATUS	*	1			x						x																						sh
	HISTER UNICOLOR	42	11			x						x																						sh
	SAPRINUS LAUTUS	1	1			x						x																						h
HISTERIDAE Ergebnis		43	13	3	0	3					3	3															1							?
HYDRAENIDAE	HYDRENA BRITTENI	1	1			x																												?
HYDRAENIDAE Ergebnis		1	1	1	0	1														1							1							?
HYDROPHILIDAE	SPHAERIDIUM BIPUSTULATUS	1	1			x																												?
HYDROPHILIDAE Ergebnis		1	1	1	1	0						1																						?
LAMPYRIDAE	LAMPYRIZOHA SPLENDIDULA	5	4			x																												h
LAMPYRIDAE Ergebnis		5	4	1	1	0						1															1							h
LATHRIDIIDAE	CARTODERE ELONGATA	28	20			x																												sh
	CORTICARINA ABIETUM	1	1			x																												?
	LATHRIDIIUS NODIFER	1	2			x																												h
	LATHRIDIIUS RUGICOLLIS	1	1			x																												h
LATHRIDIIDAE Ergebnis		31	24	4	3	1																					3	1	2	4	0	0		?
LYCIDAE	DICTYOPTERA AURORA	1	1			x																												?
LYCIDAE Ergebnis		1	1	1	1	0																												?
LYMEXYLONIDAE	HYLECOETUS DERMESTOIDES	22	16		x			1																										sh

* nicht quantitativ erfasste Freilandbeobachtungen

die lokale Häufigkeit ist nicht subjektiv bemessen

RITTEN 1992 - 1996 BIOLOGISCHE UND ÖKOLOGISCHE HINWEISE

AUFSCHLÜSSELUNG DER GEFANGENEN ARTEN										BIOLOGISCHE UND ÖKOLOGISCHE HINWEISE																									
FAMILY	SPECIES	gefangene Exemplare	Anzahl der Fänge	Arten pro Familie	eurytome Art	stenotome Art	polyphage Art	xylophage Art	phytophage Art	pollenophage Art	muscophage Art	coprophage Art	necrophage Art	carnivore Art	mycetophage Art	entomophage Art	Nahrungsspezialist	xerophile Art	hygrophile Art	thermophile Art	saprophile Art	phileophile Art	arbkole Art	colbkole Art	florikole - herbikole Art	silvikole Art	succikole Art	pratbkole Art	humikole Art	detritikole Art	Rote Liste Südtirols	Bemerkenswerte Funde	Neufund	Häufigkeitskategorie	
LYMEXYLONIDAE Ergebnis	DANACAEA DENTICOLLIS	22	16	1	1	0	1	1	x	x					1				x		x			1	1	1	1	1				0	0	0	s
	DASYTES CAERULEUS	*	1		x			x	x	x																x	x							h	
	DASYTES NIGER	*	1		x			x	x	x											x				x	x	x							h	
	DASYTES ALPIGRADUS	7	5		x			x	x	x															x	x	x							h	
	HAPLOCNEMUS AESTIVUS	1	1		x			x	x	x									x							x	x					x		s	
MELYRIDAE Ergebnis	HAPLOCNEMUS TARSALIS	2	2					x	x	x											x					x	x							h	
	HAPLOCNEMUS VIRENS	1	2					x	x	x																x	x							h	
	MORDELLA HOLOMELAENA	11	13	7	1	6		7	7	7									2	4						7	3	4				0	1	0	
		1	1		x					x																x						5	x		
		1	1		1	0	1																			1						1	1	0	sh
MORDELLIDAE Ergebnis	GLISCHROCHILUS QUADRIPUNCTATUS	48	19		x																			x	x	x	x	x						h	
	PITYOPHAGUS FERRUGINEUS	6	4														x								x	x							h		
	TALYCERA FERVIDA	*	1														x									x							?		
		54	24	3	1	2											2								1	2	3	1				0	0	0	
		4	4		x																				x	x						4	x	s	
OEDEMERIDAE Ergebnis	CHRYSANTHIA VIRIDISSIMA	*	1		x																					x								h	
	CALOPUS SERRATICORNIS	3	5	2	0	2		1																1	1	1	1					1	1	0	h
	NEMOSOMA ELONGATUM	1	1		x												x							x	x	x	x						sh		
		1	1		1	0	1										1							1	1	1	1					0	0	0	
		5	4		x														x															h	
PTINIDAE Ergebnis	PTINUS BIDENS	1	1		x																													h	
	PTINUS CLAVIPES	1	1																														nh		
	PTINUS SUBPILOSUS	5	4																														h		
		11	9	3	1	2													1	1					1	1	1	1				3	0	0	0
		*	1		x												x	x								x	x					4	x	ss	
PYTHIDAE Ergebnis	RHINOSIMUS RUFICOLLIS	3	3		x												x									x	x							h	
		3	4	2	0	2											2	1							2	2	2	2				1	1	0	
		9	7		x												x								x	x	x							h	
		30	24		x												x								x	x	x	x						sh	
		17	14		x												x								x	x	x	x						h	
RHIZOPHAGIDAE Ergebnis	RHIZOPHAGUS NITIDULUS	15	5		x												x																	h	
		71	50	4	3	1											4								4	4	4	4				1	0	0	
		*	1		x												x								x	x									
		*	1		1	0	1										1								1	1						0	0	0	
		5	4		x																											3	x	h	
SCAPHIDAE Ergebnis	APHODIUS ALPINUS	2	2		x																													?	

* nicht quantitativ erfaßte Freilandbeobachtungen

die lokale Häufigkeit ist rein subjektiv bemessen

RITTEN 1992 - 1996 BIOLOGISCHE UND ÖKOLOGISCHE HINWEISE

AUFSCHLÜSSELUNG DER GEFANGENEN ARTEN					BIOLOGISCHE UND ÖKOLOGISCHE HINWEISE																															
FAMILY	SPECIES	gefangene Exemplare	Anzahl der Fänge	Arten pro Familie	eurytpe Art	stenotopie Art	polyphage Art	xylophage Art	phytophage Art	pollenophage Art	muscophage Art	coprophage Art	necrophage Art	carnivore Art	mycetophage Art	entomophage Art	Nahrungsspezialist	xerophile Art	hygrophile Art	thermophile Art	saprophile Art	phileophile Art	arbitale Art	corticole Art	floricole - herbicole Art	silvicole Art	succicole Art	praticole Art	humicole Art	detritle Art	Rote Liste Südtirols	bemerkenswerte Funde	Neufund	Häufigkeitskategorie		
SCARABAEIDAE Ergebnis	APHODIUS DEPRESSUS	20	10		x						x																x								h	
	APHODIUS FIMETARIUS	4	4		x							x															x								h	
	APHODIUS FOSSOR	1	1		x							x															x								h	
	APHODIUS PRODOMUS	1	1		x							x															x								nh	
	APHODIUS RUFIPE	2	2		x							x															x								sh	
	GEOTRUPES ALPINUS	7	7			x						x															x								nh	
	GEOTRUPES STERCOROSUS	476	169		x							x															x								sh	
	HOPLIA ARGENTATA	40	12			x																					x								h	
	MELOLONTHA HIPPOCASTANI	2	2			x																													s	
	ONTHOPHAGUS FRACTICORNIS	1	1		x								x																						?	
	PHYLLOPERTHA HORTICOLA	107	37		x																															sh
	POTOSIA CUPREA	*	1		x																															nh
	TRICHIUS FASCIATUS	*	1		x																															h
	SCARABAEIDAE Ergebnis					668	254	15	9	6		10	3						2	1	1			3		4	8	12				3	4	0		
	SCOLYTIDAE	BLASTOPHAGUS MINOR	2	1		x			x																											h
		BLASTOPHAGUS PINIPERDA	*	1			x		x																											h
		CARPHEOBORUS MINIMUS	*	1			x		x																											h
		DRYOCOETES AUTOGRAPHUS	10	8		x			x																											h
		HYLASTES CUNICULARIUS	84	40		x			x																											sh
		HYLURGOPS GLABRATUS	3	2			x		x																											h
HYLURGOPS PALLIATUS		2	2		x			x																											h	
IPS ACUMINATUS		25	1					x																											h	
IPS AMITINUS		4956	79		x			x																											sh	
IPS CEMBRAE		9	9			x		x																											h	
IPS TYPOGRAPHUS		3068	69			x		x																											h	
PITYOGENES BISTRIDENTATUS		216	17			x		x																											h	
PITYOGENES CHALCHOGRAPHUS		93416	110		x			x																											sh	
PITYOGENES QUADRIDENS		23	1			x		x																											h	
PITYOPHTHORUS PITYOGRAPHUS		28	2		x			x																											h	
POLYGRAPHUS POLYGRAPHUS		2	2		x			x																											h	
XYLOCLEPTES BISPINUS		2	2		x			x																											h	
XYLOTERUS LINEATUS		28555	71		x			x																											h	
SCOLYTIDAE Ergebnis					130404	420	19	9	10	19													19	19		19					0	0	0			
SILPHIDAE	NECROPHORUS VESPILLOIDES	26	13		x							x	x						x										x						sh	
	OECOPTOMA THORACICA	5	5		x								x																x						h	
	PHOSPHUGA ATRATA	*	1		x							x	x																						?	

die lokale Häufigkeit ist rein subjektiv bemessen

* nicht quantitativ erfasste Freilandbeobachtungen

die lokale Häufigkeit ist rein subjektiv bemessen

[illegible]

[illegible]

RITTEN 1992 - 1996 BIOLOGISCHE UND ÖKOLOGISCHE HINWEISE

AUFSCHLÜSSELUNG DER GEFANGENEN ARTEN				BIOLOGISCHE UND ÖKOLOGISCHE HINWEISE																														
FAMILY	SPECIES	gefangene Exemplare	Anzahl der Fänge	Arten pro Familie	eurytope Art	stenotope Art	polyphage Art	xylophage Art	phytophage Art	pollenophage Art	muscophage Art	coprophage Art	necrophage Art	carnivore Art	mycetophage Art	entomophage Art	Nahrungsspezialist	xerophile Art	hygrophile Art	thermophile Art	saprophile Art	phileophile Art	arbicole Art	corticole Art	floricole - herbicole Art	silvicole Art	succicole Art	prat�icole Art	humicole Art	detriticole Art	Rote Liste Südtirols	bemerkenswerte Funde	Neufund	Häufigkeitskategorie
	PROTEINUS BRACHYPTERUS	4	4																															
	PROTEINUS LONGICORNIS	55	21																															
	QUEDIUS CRUENTUS	1	1																															
	QUEDIUS DUBIUS	8	6																															
	QUEDIUS FULIGINOSUS	16	13																															
	QUEDIUS LIMBATUS	5	3																															
	QUEDIUS MESOMELINUS	160	93																															
	QUEDIUS OBSCURIPENNIS	18	14																															
	QUEDIUS OCHROPTERUS	45	34																															
	QUEDIUS PARADISIANUS	114	78																															
	QUEDIUS PLAGIATUS	4	4																															
	QUEDIUS PUNCTATELLUS	1	1																															
	QUEDIUS UNICOLOR	1	1																															
	QUEDIUS XANTHOPUS	32	24																															
	STENUS CLAVICORNIS	4	4																															
	TACHINUS LATICOLLIS	45	25																															
	TACHINUS PALLIPES	139	45																															
STAPHYLINIDAE Ergebnis		1836	1071	85	120	98	0	67	79	41	5	23	19	42	8	58	3	25	24	16	7	2	94	55	63	101	39	63	6	28	20	24	1	0
Gesamtergebnis	Gesamtergebnis - Ritten	136.679	3.147	304																														

* nicht quantitativ erfasste Freilandbeobachtungen

die lokale Häufigkeit ist rein subjektiv bemessen